

Prévalences des facteurs de risque Saltsa de TMS dans le réseau de surveillance épidémiologique des TMS dans les Pays de la Loire (2002-2005)

Par secteurs d'activité

Laboratoire d'Ergonomie et d'Epidémiologie en Santé au
Travail (LEEST)

*Unité Associée à l'Institut de veille sanitaire (InVS)
UPRES EA 4336, SFR ICAT U208*

Avril 2012



FACULTÉ
DE MÉDECINE



En 2002, l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) a mis en place un réseau de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques (TMS) dans la région des Pays de la Loire. Grâce à la participation de 83 médecins du travail des cinq départements de la région, un échantillon de 3 710 salariés tirés au sort parmi les effectifs des médecins a pu être constitué entre 2002 et 2005. Les données de cette phase initiale ont été recueillies à l'aide d'un autoquestionnaire rempli par le salarié en salle d'attente qui portait sur les symptômes musculo-squelettiques et les conditions de travail, et d'un examen clinique réalisé par le médecin conformément au consensus européen Saltsa pour le diagnostic des TMS.

Ce document est un rapport synthétique qui présente les **prévalences** et intervalles de confiance à 95 % des **facteurs de risque Saltsa de TMS** (tableau 1) qui permettent de calculer les scores d'exposition au risque de TMS selon les recommandations du consensus européen Saltsa¹.

Les prévalences sont présentées par secteur d'activité selon la **nomenclature d'activités française NAF-2003** et la **nomenclature économique de synthèse NES 1994-2007** de l'Insee.

Les prévalences ont été calculées seulement pour les secteurs d'activité présentant un effectif d'au moins 10 salariés.

Tableau 1 : Facteurs de risque de TMS de la nuque et du membre supérieur

Critères de définition	
<i>Généraux</i>	
	Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4h/jour
	Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs
	Manipulation de charges de plus de 4 kg plus d'1h/jour (à l'exclusion de la nuque)
	Demande psychologique élevée (score \geq 75 %)
	Soutien social faible (score \leq 25 %)
<i>Spécifiques</i>	
Nuque	Mouvements de flexion du cou plus de 4h/jour
	Mouvements d'extension du cou plus de 4h/jour
	Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4h/jour
	Travail sur écran plus de 4h/jour
Epaule	Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2h/jour
	Extension du ou des bras en arrière plus de 2h/jour
Coude	Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2h/jour
	Mouvement de flexion/extension du coude plus de 2h/jour
Poignet	Mouvement de pronation-supination plus de 2h/jour
	Mouvements de torsion du poignet plus de 2h/jour
	Utilisation d'un outil vibrant plus de 2h/jour
	Utilisation de la pince-pouce index plus de 4h/jour
	Utilisation d'un clavier informatique plus de 4h/jour

¹ Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen MH. Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper-extremity musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health. 2001;27 Suppl 1:1-102.

Nomenclature d'activités française NAF-2003

HOMMES : Effectif = 41

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	36,6 [21,8 ; 51,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,3 [1,5 ; 19,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	65,6 [49,2 ; 82,1]
Demande psychologique élevée	18,4 [7,7 ; 34,3]
Soutien social faible	17,6 [6,8 ; 34,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,0 [10,6 ; 37,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	9,8 [2,7 ; 23,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	0,0

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,2 [4,1 ; 26,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,5 [1,6 ; 20,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,6 [5,6 ; 29,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	47,5 [32,0 ; 63,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	14,6 [5,6 ; 29,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	43,9 [28,7 ; 59,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,8 [2,7 ; 23,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,3 [1,5 ; 19,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	0,0

FEMMES : Effectif = 30

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	66,7 [47,2 ; 82,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	30,0 [14,7 ; 49,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	56,0 [36,5 ; 75,5]
Demande psychologique élevée	24,1 [10,3 ; 43,5]
Soutien social faible	37,9 [20,3 ; 55,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	43,3 [25,6 ; 61,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,7 [0,8 ; 22,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	10,0 [2,1 ; 26,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	23,3 [9,9 ; 42,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	13,3 [3,8 ; 30,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	26,7 [12,3 ; 45,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	33,3 [17,3 ; 52,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	6,7 [0,8 ; 22,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	66,7 [47,2 ; 82,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	13,3 [3,8 ; 30,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	10,0 [2,1 ; 26,5]

ENSEMBLE : Effectif = 71

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	49,3 [37,7 ; 60,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	16,9 [8,2 ; 25,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	61,4 [48,8 ; 74,0]
Demande psychologique élevée	20,9 [11,2 ; 30,6]
Soutien social faible	27,0 [16,0 ; 37,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	31,0 [20,2 ; 41,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,5 [3,2 ; 17,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	4,2 [0,9 ; 11,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	16,9 [8,2 ; 25,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	10,0 [4,1 ; 19,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	19,7 [10,5 ; 29,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	41,4 [29,9 ; 53,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,3 [5,0 ; 21,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	53,5 [41,9 ; 65,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,6 [1,6 ; 13,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,9 [4,1 ; 19,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	4,2 [0,9 ; 11,9]

HOMMES : Effectif = 183

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	31,7 [25,0 ; 38,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	13,1 [8,2 ; 18,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	56,1 [48,3 ; 63,9]
Demande psychologique élevée	29,7 [23,0 ; 36,3]
Soutien social faible	24,2 [18,0 ; 30,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	23,2 [17,1 ; 29,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,5 [0,0 ; 3,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,9 [1,6 ; 7,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	11,0 [6,4 ; 15,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,4 [9,3 ; 19,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,8 [0,9 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,7 [7,9 ; 17,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	32,6 [25,8 ; 39,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,3 [8,3 ; 18,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	35,2 [28,2 ; 42,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,8 [4,7 ; 13,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,1 [3,1 ; 10,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,3 [4,3 ; 12,3]

FEMMES : Effectif = 113

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	46,9 [37,7 ; 56,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,5 [5,6 ; 17,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	42,3 [32,4 ; 52,1]
Demande psychologique élevée	33,0 [24,3 ; 41,7]
Soutien social faible	33,3 [24,6 ; 42,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	31,0 [22,4 ; 39,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,9 [0,0 ; 4,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,3 [2,0 ; 11,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	29,2 [20,8 ; 37,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	17,7 [10,7 ; 24,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,2 [2,5 ; 12,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,2 [7,7 ; 20,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	45,0 [35,8 ; 54,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	9,7 [5,0 ; 16,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	43,8 [34,6 ; 52,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,3 [2,0 ; 11,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,5 [5,6 ; 17,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	29,2 [20,8 ; 37,6]

ENSEMBLE : Effectif = 296

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	37,5 [32,0 ; 43,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	12,5 [8,7 ; 16,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,8 [44,6 ; 57,0]
Demande psychologique élevée	31,0 [25,7 ; 36,2]
Soutien social faible	27,6 [22,5 ; 32,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	26,2 [21,2 ; 31,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,7 [0,1 ; 2,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,4 [2,1 ; 6,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	18,0 [13,6 ; 22,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	15,6 [11,5 ; 19,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,1 [1,8 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	13,3 [9,4 ; 17,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	37,3 [31,8 ; 42,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,9 [8,2 ; 15,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	38,4 [32,9 ; 44,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,5 [4,5 ; 10,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,2 [5,0 ; 11,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,3 [12,1 ; 20,6]

HOMMES : Effectif = 1

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	18,2 [2,3 ; 51,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	11,1 [0,3 ; 48,2]
Demande psychologique élevée	41,7 [15,2 ; 72,3]
Soutien social faible	45,5 [16,7 ; 76,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	58,3 [27,7 ; 84,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	58,3 [27,7 ; 84,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]

ENSEMBLE : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	16,7 [2,1 ; 48,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Demande psychologique élevée	46,2 [19,2 ; 74,9]
Soutien social faible	50,0 [21,1 ; 78,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	53,8 [25,1 ; 80,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,5 [13,9 ; 68,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	53,8 [25,1 ; 80,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]

HOMMES : Effectif = 8

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 28

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	50,0 [31,5 ; 68,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	17,9 [6,1 ; 36,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Demande psychologique élevée	10,7 [2,3 ; 28,2]
Soutien social faible	10,7 [2,3 ; 28,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	82,1 [63,1 ; 93,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,6 [0,1 ; 18,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	7,1 [0,9 ; 23,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,3 [4,0 ; 32,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,6 [0,1 ; 18,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,3 [4,0 ; 32,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	60,7 [42,6 ; 78,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	7,1 [0,9 ; 23,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	60,7 [42,6 ; 78,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,1 [0,9 ; 23,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	39,3 [21,2 ; 57,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	7,1 [0,9 ; 23,5]

ENSEMBLE : Effectif = 36

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	48,6 [32,0 ; 65,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	14,3 [4,8 ; 30,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	25,0 [9,8 ; 46,7]
Demande psychologique élevée	16,7 [6,4 ; 32,8]
Soutien social faible	11,1 [3,1 ; 26,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	77,8 [60,8 ; 89,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,6 [0,7 ; 18,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	11,1 [3,1 ; 26,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	19,4 [8,2 ; 36,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,8 [0,1 ; 14,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,7 [6,4 ; 32,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	63,9 [48,2 ; 79,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,3 [1,8 ; 22,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	61,1 [45,2 ; 77,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	11,1 [3,1 ; 26,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	38,9 [23,0 ; 54,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	11,1 [3,1 ; 26,1]

HOMMES : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	33,3 [15,6 ; 55,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,2 [0,1 ; 21,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	72,2 [46,5 ; 90,3]
Demande psychologique élevée	16,7 [4,7 ; 37,4]
Soutien social faible	33,3 [15,6 ; 55,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	12,5 [2,7 ; 32,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,5 [2,7 ; 32,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	20,8 [7,1 ; 42,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	30,4 [13,2 ; 52,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	20,8 [7,1 ; 42,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	33,3 [15,6 ; 55,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	29,2 [12,6 ; 51,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]

FEMMES : Effectif = 6

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 30

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	36,7 [19,4 ; 53,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,7 [0,8 ; 22,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	62,5 [40,6 ; 81,2]
Demande psychologique élevée	20,0 [7,7 ; 38,6]
Soutien social faible	26,7 [12,3 ; 45,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [5,6 ; 34,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	10,0 [2,1 ; 26,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	23,3 [9,9 ; 42,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,0 [2,1 ; 26,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,7 [5,6 ; 34,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,0 [15,3 ; 50,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	16,7 [5,6 ; 34,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,0 [14,7 ; 49,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	23,3 [9,9 ; 42,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	23,3 [9,9 ; 42,3]

HOMMES : Effectif = 51

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	25,5 [13,5 ; 37,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,0 [0,0 ; 10,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,1 [36,8 ; 65,4]
Demande psychologique élevée	17,6 [8,4 ; 30,9]
Soutien social faible	28,3 [15,2 ; 41,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	11,8 [4,4 ; 23,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	5,9 [1,2 ; 16,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [1,2 ; 16,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	33,3 [20,4 ; 46,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	5,9 [1,2 ; 16,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,9 [1,2 ; 16,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	27,5 [15,2 ; 39,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	35,3 [22,2 ; 48,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,7 [5,7 ; 26,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	47,1 [33,4 ; 60,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	29,4 [16,9 ; 41,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,9 [1,2 ; 16,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	31,4 [18,6 ; 44,1]

FEMMES : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	33,3 [9,9 ; 65,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	16,7 [2,1 ; 48,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	33,3 [7,5 ; 70,1]
Demande psychologique élevée	50,0 [21,1 ; 78,9]
Soutien social faible	54,5 [23,4 ; 83,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	50,0 [21,1 ; 78,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]

ENSEMBLE : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	27,0 [16,0 ; 37,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,8 [1,0 ; 13,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	48,2 [35,1 ; 61,3]
Demande psychologique élevée	23,8 [13,3 ; 34,3]
Soutien social faible	33,3 [21,1 ; 45,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	17,5 [8,1 ; 26,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	4,8 [1,0 ; 13,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,3 [1,8 ; 15,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	31,7 [20,3 ; 43,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,3 [1,8 ; 15,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,3 [1,8 ; 15,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	23,8 [13,3 ; 34,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,1 [26,1 ; 50,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,1 [4,6 ; 21,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	46,0 [33,7 ; 58,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	25,4 [14,6 ; 36,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,9 [2,6 ; 17,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	30,2 [18,8 ; 41,5]

HOMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,5 [6,8 ; 49,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,9 [0,1 ; 28,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	62,5 [35,4 ; 84,8]
Demande psychologique élevée	29,4 [10,3 ; 56,0]
Soutien social faible	29,4 [10,3 ; 56,0]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	29,4 [10,3 ; 56,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	35,3 [14,2 ; 61,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	29,4 [10,3 ; 56,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	47,1 [23,0 ; 72,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]

FEMMES : Effectif = 9

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	19,2 [6,6 ; 39,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,8 [0,1 ; 19,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	56,5 [36,3 ; 76,8]
Demande psychologique élevée	34,6 [17,2 ; 55,7]
Soutien social faible	26,9 [11,6 ; 47,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	19,2 [6,6 ; 39,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,8 [0,1 ; 19,6]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	30,8 [14,3 ; 51,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	3,8 [0,1 ; 19,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	15,4 [4,4 ; 34,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	34,6 [17,2 ; 55,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	26,9 [11,6 ; 47,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	42,3 [23,3 ; 61,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	11,5 [2,4 ; 30,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	20,0 [6,8 ; 40,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	23,1 [9,0 ; 43,6]

HOMMES : Effectif = 8

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 10

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	50,0 [18,7 ; 81,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	20,0 [2,5 ; 55,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	30,0 [6,7 ; 65,2]
Demande psychologique élevée	30,0 [6,7 ; 65,2]
Soutien social faible	20,0 [2,5 ; 55,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	40,0 [12,2 ; 73,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,0 [12,2 ; 73,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	40,0 [12,2 ; 73,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	40,0 [12,2 ; 73,8]

HOMMES : Effectif = 85

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	21,2 [12,5 ; 29,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,7 [1,3 ; 11,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	55,6 [44,7 ; 66,4]
Demande psychologique élevée	31,8 [21,9 ; 41,7]
Soutien social faible	25,9 [16,6 ; 35,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	25,9 [16,6 ; 35,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,4 [0,3 ; 8,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,1 [2,6 ; 14,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,0 [11,5 ; 28,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,2 [3,4 ; 16,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	1,2 [0,0 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	15,3 [7,6 ; 22,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	29,4 [19,7 ; 39,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	23,8 [14,7 ; 32,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	42,2 [31,5 ; 52,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	20,0 [11,5 ; 28,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	16,7 [8,7 ; 24,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,6 [9,5 ; 25,8]

FEMMES : Effectif = 45

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	60,0 [45,7 ; 74,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	22,2 [11,2 ; 37,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	42,9 [27,9 ; 57,8]
Demande psychologique élevée	33,3 [19,6 ; 47,1]
Soutien social faible	28,9 [15,6 ; 42,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	48,9 [34,3 ; 63,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	17,8 [8,0 ; 32,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	15,6 [6,5 ; 29,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	17,8 [8,0 ; 32,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,4 [0,5 ; 15,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	35,6 [21,6 ; 49,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	51,1 [36,5 ; 65,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	20,5 [9,8 ; 35,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	65,1 [50,9 ; 79,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	26,7 [13,7 ; 39,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,6 [6,5 ; 29,5]

ENSEMBLE : Effectif = 130

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	34,6 [26,4 ; 42,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	10,8 [5,4 ; 16,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,2 [42,4 ; 60,1]
Demande psychologique élevée	32,3 [24,3 ; 40,3]
Soutien social faible	26,9 [19,3 ; 34,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	33,8 [25,7 ; 42,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,5 [0,2 ; 5,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	10,8 [5,4 ; 16,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	18,5 [11,8 ; 25,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,5 [6,0 ; 17,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,3 [0,5 ; 6,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	22,3 [15,2 ; 29,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	36,9 [28,6 ; 45,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	22,7 [15,4 ; 29,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	50,0 [41,3 ; 58,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	13,2 [7,3 ; 19,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	20,2 [13,2 ; 27,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,9 [10,5 ; 23,4]

HOMMES : Effectif = 22

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	18,2 [5,2 ; 40,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,5 [0,1 ; 22,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,0 [29,1 ; 70,9]
Demande psychologique élevée	18,2 [5,2 ; 40,3]
Soutien social faible	22,7 [7,8 ; 45,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,2 [5,2 ; 40,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	18,2 [5,2 ; 40,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	13,6 [2,9 ; 34,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	18,2 [5,2 ; 40,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,5 [0,1 ; 22,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	18,2 [5,2 ; 40,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,8 [13,9 ; 54,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	18,2 [5,2 ; 40,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	27,3 [10,7 ; 50,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	31,8 [13,9 ; 54,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	13,6 [2,9 ; 34,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	13,6 [2,9 ; 34,9]

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,2 [0,1 ; 21,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	45,8 [25,9 ; 65,8]
Demande psychologique élevée	20,8 [7,1 ; 42,2]
Soutien social faible	20,8 [7,1 ; 42,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,8 [7,1 ; 42,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,2 [0,1 ; 21,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	29,2 [12,6 ; 51,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	25,0 [9,8 ; 46,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	29,2 [12,6 ; 51,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	12,5 [2,7 ; 32,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	20,8 [7,1 ; 42,2]

HOMMES : Effectif = 23

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	43,5 [23,2 ; 63,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,3 [0,1 ; 21,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	54,5 [33,7 ; 75,4]
Demande psychologique élevée	17,4 [5,0 ; 38,8]
Soutien social faible	30,4 [13,2 ; 52,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	21,7 [7,5 ; 43,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	8,7 [1,1 ; 28,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,7 [1,1 ; 28,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	30,4 [13,2 ; 52,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	26,1 [10,2 ; 48,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,0 [2,8 ; 33,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	43,5 [23,2 ; 63,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	21,7 [7,5 ; 43,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	13,0 [2,8 ; 33,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,7 [1,1 ; 28,0]

FEMMES : Effectif = 6

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 29

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	48,3 [30,1 ; 66,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,4 [0,1 ; 17,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,0 [31,5 ; 68,5]
Demande psychologique élevée	17,2 [5,8 ; 35,8]
Soutien social faible	24,1 [10,3 ; 43,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,1 [10,3 ; 43,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,9 [0,8 ; 22,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	31,0 [15,3 ; 50,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	27,6 [12,7 ; 47,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,8 [3,9 ; 31,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	44,8 [26,7 ; 62,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	20,7 [8,0 ; 39,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]

HOMMES : Effectif = 91

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	17,6 [9,8 ; 25,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,2 [0,3 ; 7,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,7 [41,2 ; 62,2]
Demande psychologique élevée	31,5 [21,8 ; 41,1]
Soutien social faible	24,4 [15,6 ; 33,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	19,8 [11,6 ; 28,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,4 [1,2 ; 10,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	15,4 [8,0 ; 22,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	13,2 [6,2 ; 20,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,6 [2,5 ; 13,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,1 [6,2 ; 20,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	33,0 [23,3 ; 42,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	29,7 [20,3 ; 39,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	46,1 [35,7 ; 56,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	27,5 [18,3 ; 36,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,7 [3,1 ; 15,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,5 [8,9 ; 24,1]

FEMMES : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	9,1 [0,2 ; 41,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Demande psychologique élevée	45,5 [16,7 ; 76,6]
Soutien social faible	30,0 [6,7 ; 65,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	63,6 [30,8 ; 89,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	54,5 [23,4 ; 83,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	45,5 [16,7 ; 76,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	54,5 [23,4 ; 83,3]

ENSEMBLE : Effectif = 102

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	18,6 [11,1 ; 26,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,9 [0,6 ; 8,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	46,9 [37,1 ; 56,8]
Demande psychologique élevée	33,0 [23,8 ; 42,2]
Soutien social faible	25,0 [16,5 ; 33,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,5 [16,2 ; 32,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,9 [1,6 ; 11,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	19,6 [11,9 ; 27,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	13,7 [7,0 ; 20,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,9 [2,8 ; 13,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,7 [6,3 ; 19,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,4 [22,4 ; 40,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	27,5 [18,8 ; 36,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	46,0 [36,2 ; 55,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	25,5 [17,0 ; 33,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,8 [4,1 ; 16,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	20,6 [12,7 ; 28,4]

HOMMES : Effectif = 90

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,5 [12,0 ; 28,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,3 [0,3 ; 8,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	53,8 [42,8 ; 64,9]
Demande psychologique élevée	24,7 [15,8 ; 33,7]
Soutien social faible	26,7 [17,5 ; 35,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	26,7 [17,5 ; 35,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,9 [3,9 ; 16,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	15,7 [8,2 ; 23,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,4 [7,2 ; 21,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,8 [3,2 ; 15,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,8 [9,9 ; 25,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	42,2 [32,0 ; 52,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	31,5 [21,8 ; 41,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	36,0 [26,0 ; 45,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	24,4 [15,6 ; 33,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,9 [3,9 ; 16,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	14,4 [7,2 ; 21,7]

FEMMES : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	50,0 [30,8 ; 69,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,5 [2,4 ; 30,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	31,6 [12,6 ; 56,6]
Demande psychologique élevée	29,2 [12,6 ; 51,1]
Soutien social faible	25,0 [9,8 ; 46,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	46,2 [27,0 ; 65,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,7 [0,9 ; 25,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	50,0 [30,8 ; 69,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	3,8 [0,1 ; 19,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,8 [0,1 ; 19,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	11,5 [2,4 ; 30,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	30,8 [14,3 ; 51,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	3,8 [0,1 ; 19,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,9 [11,6 ; 47,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,7 [0,9 ; 25,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,7 [0,9 ; 25,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	46,2 [27,0 ; 65,3]

ENSEMBLE : Effectif = 116

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	27,2 [19,0 ; 35,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,4 [1,4 ; 9,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	49,5 [39,5 ; 59,4]
Demande psychologique élevée	25,7 [17,6 ; 33,7]
Soutien social faible	26,3 [18,2 ; 34,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	31,0 [22,6 ; 39,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,6 [4,2 ; 15,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	23,5 [15,7 ; 31,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,1 [6,1 ; 18,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,9 [3,0 ; 13,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,4 [9,6 ; 23,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	39,7 [30,8 ; 48,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	25,2 [17,3 ; 33,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	33,9 [25,3 ; 42,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	20,7 [13,3 ; 28,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,6 [4,2 ; 15,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	21,6 [14,1 ; 29,0]

HOMMES : Effectif = 34

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	14,7 [5,0 ; 31,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,9 [0,7 ; 19,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	32,3 [16,7 ; 51,4]
Demande psychologique élevée	58,8 [42,3 ; 75,4]
Soutien social faible	29,4 [15,1 ; 47,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,6 [8,7 ; 37,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,8 [1,9 ; 23,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	58,8 [42,3 ; 75,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	5,9 [0,7 ; 19,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,7 [5,0 ; 31,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,2 [21,9 ; 54,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,8 [3,3 ; 27,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	29,4 [15,1 ; 47,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,9 [0,7 ; 19,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	61,8 [45,4 ; 78,1]

FEMMES : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	30,8 [9,1 ; 61,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	15,4 [1,9 ; 45,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	61,5 [31,6 ; 86,1]
Demande psychologique élevée	38,5 [13,9 ; 68,4]
Soutien social faible	38,5 [13,9 ; 68,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	46,2 [19,2 ; 74,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	84,6 [54,6 ; 98,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	53,8 [25,1 ; 80,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,8 [9,1 ; 61,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	69,2 [38,6 ; 90,9]

ENSEMBLE : Effectif = 47

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	19,1 [9,1 ; 33,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	8,5 [2,4 ; 20,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	40,9 [26,4 ; 55,4]
Demande psychologique élevée	53,2 [38,9 ; 67,5]
Soutien social faible	31,9 [18,6 ; 45,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	27,7 [14,9 ; 40,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,4 [1,3 ; 17,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	66,0 [52,4 ; 79,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,6 [3,5 ; 23,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,1 [0,1 ; 11,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,8 [4,8 ; 25,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	42,6 [28,4 ; 56,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,8 [4,8 ; 25,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	29,8 [16,7 ; 42,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,5 [2,4 ; 20,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,1 [0,1 ; 11,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	63,8 [50,1 ; 77,6]

HOMMES : Effectif = 20

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,0 [0,1 ; 24,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]
Demande psychologique élevée	35,0 [15,4 ; 59,2]
Soutien social faible	30,0 [11,9 ; 54,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,0 [0,1 ; 24,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	25,0 [8,7 ; 49,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	15,0 [3,2 ; 37,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,0 [0,1 ; 24,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	35,0 [15,4 ; 59,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,0 [0,1 ; 24,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]

FEMMES : Effectif = 9

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 29

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	27,6 [12,7 ; 47,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,9 [0,8 ; 22,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	34,5 [17,9 ; 54,3]
Demande psychologique élevée	27,6 [12,7 ; 47,2]
Soutien social faible	27,6 [12,7 ; 47,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	37,9 [20,3 ; 55,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,9 [0,8 ; 22,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	27,6 [12,7 ; 47,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,4 [0,1 ; 17,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	27,6 [12,7 ; 47,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	34,5 [17,9 ; 54,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	6,9 [0,8 ; 22,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	24,1 [10,3 ; 43,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	13,8 [3,9 ; 31,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	13,8 [3,9 ; 31,7]

HOMMES : Effectif = 15

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,3 [1,7 ; 40,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	28,6 [8,4 ; 58,1]
Demande psychologique élevée	33,3 [11,8 ; 61,6]
Soutien social faible	14,3 [1,8 ; 42,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	40,0 [16,3 ; 67,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,7 [0,2 ; 31,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	60,0 [32,3 ; 83,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,7 [0,2 ; 31,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	20,0 [4,3 ; 48,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	26,7 [7,8 ; 55,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	33,3 [11,8 ; 61,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	20,0 [4,3 ; 48,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	13,3 [1,7 ; 40,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,7 [0,2 ; 31,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	46,7 [21,3 ; 73,4]

FEMMES : Effectif = 22

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	59,1 [36,4 ; 79,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	18,2 [5,2 ; 40,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	10,5 [1,3 ; 33,1]
Demande psychologique élevée	22,7 [7,8 ; 45,4]
Soutien social faible	28,6 [11,3 ; 52,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	50,0 [29,1 ; 70,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	22,7 [7,8 ; 45,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	31,8 [13,9 ; 54,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	4,5 [0,1 ; 22,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	31,8 [13,9 ; 54,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,9 [20,7 ; 63,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	4,5 [0,1 ; 22,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,5 [33,7 ; 75,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	27,3 [10,7 ; 50,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	22,7 [7,8 ; 45,4]

ENSEMBLE : Effectif = 37

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	40,5 [24,7 ; 56,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	10,8 [3,0 ; 25,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	18,2 [7,0 ; 35,5]
Demande psychologique élevée	27,0 [13,8 ; 44,1]
Soutien social faible	22,9 [10,4 ; 40,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	45,9 [29,9 ; 62,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	16,2 [6,2 ; 32,0]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	43,2 [27,3 ; 59,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	5,4 [0,7 ; 18,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	27,0 [13,8 ; 44,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	35,1 [19,8 ; 50,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	16,2 [6,2 ; 32,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	40,5 [24,7 ; 56,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,4 [0,7 ; 18,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	18,9 [8,0 ; 35,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	32,4 [17,3 ; 47,5]

HOMMES : Effectif = 20

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	33,3 [13,3 ; 59,0]
Demande psychologique élevée	36,8 [16,3 ; 61,6]
Soutien social faible	20,0 [5,7 ; 43,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	15,0 [3,2 ; 37,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	40,0 [19,1 ; 63,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	25,0 [8,7 ; 49,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,0 [19,1 ; 63,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	45,0 [23,1 ; 68,5]

FEMMES : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	52,0 [32,4 ; 71,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	28,0 [12,1 ; 49,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	25,0 [9,8 ; 46,7]
Demande psychologique élevée	34,6 [17,2 ; 55,7]
Soutien social faible	30,8 [14,3 ; 51,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	52,0 [32,4 ; 71,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,8 [0,1 ; 19,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	26,9 [11,6 ; 47,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,5 [19,8 ; 57,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	7,7 [0,9 ; 25,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	50,0 [30,8 ; 69,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,7 [0,9 ; 25,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	26,9 [11,6 ; 47,8]

ENSEMBLE : Effectif = 46

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	37,8 [23,6 ; 51,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	15,6 [6,5 ; 29,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	28,6 [14,9 ; 42,2]
Demande psychologique élevée	35,6 [21,6 ; 49,5]
Soutien social faible	26,1 [13,4 ; 38,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	37,8 [23,6 ; 51,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,2 [0,1 ; 11,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,5 [1,4 ; 17,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	32,6 [19,1 ; 46,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	4,3 [0,5 ; 14,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,9 [3,6 ; 23,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	39,1 [25,0 ; 53,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,0 [4,9 ; 26,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	41,3 [27,1 ; 55,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	4,3 [0,5 ; 14,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,7 [2,4 ; 20,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	34,8 [21,0 ; 48,5]

HOMMES : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	25,4 [14,6 ; 36,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,3 [1,8 ; 15,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	52,6 [39,7 ; 65,6]
Demande psychologique élevée	17,7 [8,2 ; 27,3]
Soutien social faible	32,8 [21,0 ; 44,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	19,4 [9,5 ; 29,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,2 [0,4 ; 11,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,5 [1,8 ; 15,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,7 [8,2 ; 27,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,7 [3,6 ; 19,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,8 [1,0 ; 13,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	19,4 [9,5 ; 29,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	51,6 [39,2 ; 64,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	27,4 [16,3 ; 38,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,1 [41,6 ; 66,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	22,6 [12,2 ; 33,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,3 [4,7 ; 21,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,1 [8,0 ; 27,7]

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 65

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	26,2 [15,5 ; 36,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,7 [2,5 ; 17,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,7 [38,9 ; 64,6]
Demande psychologique élevée	18,8 [9,2 ; 28,3]
Soutien social faible	34,9 [23,1 ; 46,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,3 [10,5 ; 30,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,1 [0,4 ; 10,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,3 [1,7 ; 15,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,2 [7,9 ; 26,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,4 [3,5 ; 19,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,3 [1,7 ; 15,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	20,3 [10,5 ; 30,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	50,0 [37,8 ; 62,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	28,1 [17,1 ; 39,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,0 [41,7 ; 66,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	23,4 [13,1 ; 33,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	12,5 [5,6 ; 23,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,6 [7,8 ; 26,9]

HOMMES : Effectif = 9

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	45,5 [16,7 ; 76,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	54,5 [23,4 ; 83,3]
Demande psychologique élevée	27,3 [6,0 ; 61,0]
Soutien social faible	9,1 [0,2 ; 41,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	45,5 [16,7 ; 76,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	36,4 [10,9 ; 69,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	36,4 [10,9 ; 69,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	45,5 [16,7 ; 76,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	36,4 [10,9 ; 69,2]

HOMMES : Effectif = 57

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	29,1 [17,1 ; 41,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,6 [0,4 ; 12,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	65,4 [52,5 ; 78,3]
Demande psychologique élevée	21,1 [10,5 ; 31,6]
Soutien social faible	34,5 [22,0 ; 47,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	29,8 [17,9 ; 41,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	7,1 [2,0 ; 17,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,5 [8,7 ; 29,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,0 [6,3 ; 25,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,5 [0,4 ; 12,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,5 [8,7 ; 29,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	43,9 [31,0 ; 56,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	17,5 [8,7 ; 29,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	44,6 [31,6 ; 57,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	15,8 [7,5 ; 27,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	15,8 [7,5 ; 27,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	19,3 [9,1 ; 29,5]

FEMMES : Effectif = 45

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	60,0 [45,7 ; 74,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	13,3 [5,1 ; 26,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	40,0 [24,8 ; 55,2]
Demande psychologique élevée	30,2 [16,5 ; 44,0]
Soutien social faible	25,6 [12,5 ; 38,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	66,7 [52,9 ; 80,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,4 [0,5 ; 15,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	40,0 [25,7 ; 54,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,7 [1,4 ; 18,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,4 [0,5 ; 15,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	4,4 [0,5 ; 15,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,1 [17,6 ; 44,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	6,7 [1,4 ; 18,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,8 [39,7 ; 69,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,7 [1,4 ; 18,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	20,5 [9,8 ; 35,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	40,0 [25,7 ; 54,3]

ENSEMBLE : Effectif = 102

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	43,0 [33,3 ; 52,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	8,0 [3,5 ; 15,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	54,3 [44,2 ; 64,5]
Demande psychologique élevée	25,0 [16,5 ; 33,5]
Soutien social faible	30,6 [21,5 ; 39,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	46,1 [36,4 ; 55,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	4,0 [1,1 ; 9,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,0 [0,2 ; 6,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	27,5 [18,8 ; 36,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,8 [5,5 ; 18,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,9 [1,1 ; 9,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	11,8 [5,5 ; 18,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,2 [28,8 ; 47,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,7 [6,3 ; 19,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	49,0 [39,1 ; 58,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	11,8 [5,5 ; 18,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	17,8 [10,4 ; 25,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	28,4 [19,7 ; 37,2]

HOMMES : Effectif = 7

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 3

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 10

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	0,0
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	55,6 [21,2 ; 86,3]
Demande psychologique élevée	20,0 [2,5 ; 55,6]
Soutien social faible	50,0 [18,7 ; 81,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,0 [6,7 ; 65,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]

HOMMES : Effectif = 189

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,2 [14,5 ; 26,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	57,7 [50,4 ; 65,0]
Demande psychologique élevée	22,3 [16,4 ; 28,3]
Soutien social faible	20,9 [15,0 ; 26,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,1 [12,6 ; 23,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,2 [1,2 ; 6,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,4 [3,7 ; 11,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	8,0 [4,1 ; 11,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	30,6 [24,0 ; 37,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	9,6 [5,4 ; 13,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	25,5 [19,3 ; 31,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	47,3 [40,2 ; 54,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	34,2 [27,4 ; 41,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	48,4 [41,1 ; 55,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	42,0 [35,0 ; 49,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,0 [4,1 ; 11,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,0 [4,1 ; 11,9]

FEMMES : Effectif = 25

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,0 [6,8 ; 40,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,0 [0,1 ; 20,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	14,3 [3,0 ; 36,3]
Demande psychologique élevée	20,0 [6,8 ; 40,7]
Soutien social faible	29,2 [12,6 ; 51,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,0 [9,4 ; 45,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	80,0 [59,3 ; 93,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,0 [0,1 ; 20,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [6,8 ; 40,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	16,0 [4,5 ; 36,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,0 [0,1 ; 20,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	76,0 [54,9 ; 90,6]

ENSEMBLE : Effectif = 214

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,2 [14,8 ; 25,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,5 [0,0 ; 2,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	53,1 [46,1 ; 60,0]
Demande psychologique élevée	22,1 [16,5 ; 27,6]
Soutien social faible	21,8 [16,2 ; 27,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,8 [13,5 ; 24,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,8 [1,0 ; 6,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,6 [3,2 ; 9,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	16,4 [11,5 ; 21,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	27,0 [21,0 ; 33,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,9 [5,1 ; 12,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	23,5 [17,8 ; 29,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	44,1 [37,5 ; 50,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	31,1 [24,9 ; 37,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	44,5 [37,8 ; 51,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	37,1 [30,6 ; 43,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,5 [4,0 ; 11,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,0 [11,0 ; 20,9]

HOMMES : Effectif = 62

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,1 [5,8 ; 24,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,9 [1,0 ; 13,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,9 [37,9 ; 63,9]
Demande psychologique élevée	16,9 [8,4 ; 29,0]
Soutien social faible	27,9 [16,6 ; 39,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	21,3 [11,0 ; 31,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,3 [0,4 ; 11,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,3 [0,4 ; 11,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	14,5 [6,9 ; 25,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	26,2 [15,2 ; 37,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,9 [1,0 ; 13,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	26,2 [15,2 ; 37,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	41,0 [28,6 ; 53,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	56,5 [44,1 ; 68,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	55,7 [43,3 ; 68,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	46,8 [34,4 ; 59,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,3 [4,7 ; 21,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	14,5 [6,9 ; 25,8]

FEMMES : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	9,1 [0,2 ; 41,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	12,5 [0,3 ; 52,7]
Demande psychologique élevée	45,5 [16,7 ; 76,6]
Soutien social faible	30,0 [6,7 ; 65,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	54,5 [23,4 ; 83,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	63,6 [30,8 ; 89,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	36,4 [10,9 ; 69,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	63,6 [30,8 ; 89,1]

ENSEMBLE : Effectif = 73

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,9 [6,9 ; 24,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,6 [1,5 ; 13,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	46,2 [34,0 ; 58,3]
Demande psychologique élevée	21,4 [11,8 ; 31,0]
Soutien social faible	28,2 [17,7 ; 38,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	26,4 [16,2 ; 36,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,8 [0,3 ; 9,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,8 [0,3 ; 9,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	21,9 [12,4 ; 31,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	23,6 [13,8 ; 33,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,9 [2,3 ; 15,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	23,6 [13,8 ; 33,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,3 [28,9 ; 51,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	47,9 [36,5 ; 59,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	50,0 [38,5 ; 61,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	39,7 [28,5 ; 51,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,0 [4,9 ; 20,5]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	21,9 [12,4 ; 31,4]

HOMMES : Effectif = 98

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	22,4 [14,2 ; 30,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	1,0 [0,0 ; 5,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	52,2 [41,9 ; 62,5]
Demande psychologique élevée	26,8 [18,0 ; 35,6]
Soutien social faible	33,0 [23,6 ; 42,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	14,3 [7,4 ; 21,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,0 [0,2 ; 7,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,1 [0,6 ; 8,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,6 [12,6 ; 28,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,3 [7,4 ; 21,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,1 [0,6 ; 8,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,3 [9,0 ; 23,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	30,9 [21,7 ; 40,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	16,5 [9,1 ; 23,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	20,0 [12,0 ; 28,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,2 [3,0 ; 14,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,1 [0,3 ; 7,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	19,6 [11,7 ; 27,5]

FEMMES : Effectif = 50

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	22,0 [10,5 ; 33,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,0 [0,1 ; 10,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	30,2 [16,5 ; 44,0]
Demande psychologique élevée	30,0 [17,3 ; 42,7]
Soutien social faible	32,7 [19,5 ; 45,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	38,0 [24,5 ; 51,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	4,0 [0,5 ; 13,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,0 [0,5 ; 13,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	60,0 [46,4 ; 73,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,0 [3,3 ; 21,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,0 [0,5 ; 13,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	6,0 [1,3 ; 16,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [10,0 ; 33,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	4,0 [0,5 ; 13,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	8,0 [2,2 ; 19,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	2,0 [0,1 ; 10,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,0 [2,2 ; 19,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	58,0 [44,3 ; 71,7]

ENSEMBLE : Effectif = 148

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	22,3 [15,6 ; 29,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	1,4 [0,2 ; 4,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	45,1 [36,7 ; 53,6]
Demande psychologique élevée	27,9 [20,6 ; 35,1]
Soutien social faible	32,9 [25,3 ; 40,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,3 [15,6 ; 29,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,7 [0,7 ; 6,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,4 [1,1 ; 7,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	34,0 [26,4 ; 41,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,8 [7,4 ; 18,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,4 [1,1 ; 7,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,8 [7,4 ; 18,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	27,2 [20,0 ; 34,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,2 [6,9 ; 17,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	15,9 [9,9 ; 21,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,4 [2,4 ; 10,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,1 [1,5 ; 8,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	32,7 [25,1 ; 40,2]

HOMMES : Effectif = 82

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,4 [6,9 ; 22,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,7 [0,8 ; 10,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	54,3 [43,5 ; 65,2]
Demande psychologique élevée	17,1 [8,9 ; 25,2]
Soutien social faible	23,5 [14,2 ; 32,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	15,9 [7,9 ; 23,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,0 ; 6,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,7 [0,8 ; 10,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	23,2 [14,0 ; 32,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	20,7 [12,0 ; 29,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,4 [0,3 ; 8,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	9,8 [4,3 ; 18,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,7 [21,6 ; 41,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	17,1 [8,9 ; 25,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,0 [20,0 ; 40,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,1 [2,0 ; 13,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,5 [3,5 ; 16,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	22,0 [13,0 ; 30,9]

FEMMES : Effectif = 176

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	34,1 [27,1 ; 41,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,9 [3,1 ; 10,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	46,1 [38,2 ; 54,0]
Demande psychologique élevée	21,1 [15,1 ; 27,2]
Soutien social faible	24,7 [18,3 ; 31,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,3 [16,1 ; 28,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,1 [0,1 ; 4,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,8 [3,1 ; 10,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	29,1 [22,4 ; 35,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	19,3 [13,5 ; 25,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,0 [1,6 ; 8,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,6 [12,0 ; 23,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	41,5 [34,2 ; 48,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	2,3 [0,6 ; 5,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,7 [20,2 ; 33,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	1,1 [0,1 ; 4,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,3 [3,2 ; 11,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	29,7 [22,9 ; 36,5]

ENSEMBLE : Effectif = 258

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	27,5 [22,1 ; 33,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,8 [3,0 ; 8,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	48,9 [42,5 ; 55,3]
Demande psychologique élevée	19,8 [15,0 ; 24,7]
Soutien social faible	24,3 [19,0 ; 29,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,2 [15,3 ; 25,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,2 ; 3,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,8 [3,0 ; 8,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	27,2 [21,8 ; 32,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	19,8 [14,9 ; 24,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,5 [1,6 ; 6,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	15,1 [10,7 ; 19,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,4 [32,4 ; 44,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	7,0 [3,9 ; 10,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	27,7 [22,3 ; 33,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	2,7 [1,1 ; 5,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,0 [3,9 ; 10,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	27,2 [21,8 ; 32,7]

HOMMES : Effectif = 37

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	22,2 [10,1 ; 39,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,6 [0,7 ; 18,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	57,1 [40,7 ; 73,5]
Demande psychologique élevée	54,1 [38,0 ; 70,1]
Soutien social faible	40,0 [23,8 ; 56,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	27,0 [13,8 ; 44,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,7 [0,1 ; 14,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,1 [1,7 ; 21,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	10,8 [3,0 ; 25,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,8 [3,0 ; 25,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,4 [0,7 ; 18,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	27,0 [13,8 ; 44,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	37,8 [22,2 ; 53,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	18,9 [8,0 ; 35,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	45,9 [29,9 ; 62,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,4 [0,7 ; 18,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	13,5 [4,5 ; 28,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	5,4 [0,7 ; 18,2]

FEMMES : Effectif = 48

% de salariées exposées à chaque facteur parmi les salariées répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	35,4 [21,9 ; 48,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	8,5 [2,4 ; 20,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	33,3 [19,1 ; 47,6]
Demande psychologique élevée	31,9 [18,6 ; 45,2]
Soutien social faible	34,1 [20,1 ; 48,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,9 [11,0 ; 34,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,3 [1,3 ; 17,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	22,9 [11,0 ; 34,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,5 [4,7 ; 25,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,3 [2,3 ; 20,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	18,8 [8,9 ; 32,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	47,9 [33,8 ; 62,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	10,4 [3,5 ; 22,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	44,7 [30,5 ; 58,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	2,1 [0,1 ; 11,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,3 [1,3 ; 17,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	22,9 [11,0 ; 34,8]

ENSEMBLE : Effectif = 85

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	29,8 [20,0 ; 39,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,2 [2,7 ; 15,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	44,2 [33,1 ; 55,2]
Demande psychologique élevée	41,7 [31,1 ; 52,2]
Soutien social faible	36,7 [26,1 ; 47,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,7 [15,5 ; 33,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,0 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,1 [2,6 ; 14,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,6 [9,5 ; 25,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,8 [5,8 ; 20,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,1 [2,6 ; 14,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	22,4 [13,5 ; 31,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	43,5 [33,0 ; 54,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	14,1 [6,7 ; 21,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	45,2 [34,6 ; 55,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	3,5 [0,7 ; 10,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,4 [4,2 ; 17,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,3 [7,6 ; 22,9]

HOMMES : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,8 [13,3 ; 34,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,3 [1,8 ; 15,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	61,7 [49,4 ; 74,0]
Demande psychologique élevée	9,5 [3,6 ; 19,6]
Soutien social faible	21,3 [11,0 ; 31,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	6,3 [1,8 ; 15,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,6 [0,0 ; 8,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,8 [1,0 ; 13,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	7,9 [2,6 ; 17,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	17,5 [8,1 ; 26,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,2 [0,4 ; 11,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	11,1 [4,6 ; 21,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	45,2 [32,8 ; 57,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,7 [5,6 ; 23,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	14,5 [6,9 ; 25,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,9 [2,6 ; 17,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	3,2 [0,4 ; 11,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	9,5 [3,6 ; 19,6]

FEMMES : Effectif = 19

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	21,1 [6,1 ; 45,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	10,5 [1,3 ; 33,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Demande psychologique élevée	15,8 [3,4 ; 39,6]
Soutien social faible	16,7 [3,6 ; 41,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	21,1 [6,1 ; 45,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	5,3 [0,1 ; 26,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,3 [0,1 ; 26,0]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	47,4 [24,4 ; 71,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	10,5 [1,3 ; 33,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,5 [1,3 ; 33,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	22,2 [6,4 ; 47,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	22,2 [6,4 ; 47,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	10,5 [1,3 ; 33,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	47,4 [24,4 ; 71,1]

ENSEMBLE : Effectif = 82

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,2 [14,0 ; 32,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,3 [2,7 ; 15,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,6 [39,5 ; 61,8]
Demande psychologique élevée	11,0 [5,1 ; 19,8]
Soutien social faible	20,3 [11,4 ; 29,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	9,8 [4,3 ; 18,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,4 [0,3 ; 8,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,9 [1,3 ; 12,0]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,1 [8,9 ; 25,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	13,4 [6,9 ; 22,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,9 [1,3 ; 12,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	11,0 [5,1 ; 19,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,0 [29,3 ; 50,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	9,9 [4,4 ; 18,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	16,3 [8,2 ; 24,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,5 [3,5 ; 16,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,5 [0,3 ; 8,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	18,3 [9,9 ; 26,7]

HOMMES : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	30,8 [9,1 ; 61,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	15,4 [1,9 ; 45,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	66,7 [34,9 ; 90,1]
Demande psychologique élevée	53,8 [25,1 ; 80,8]
Soutien social faible	61,5 [31,6 ; 86,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	7,7 [0,2 ; 36,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	30,8 [9,1 ; 61,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	53,8 [25,1 ; 80,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]

FEMMES : Effectif = 5

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 18

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	22,2 [6,4 ; 47,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,1 [1,4 ; 34,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	47,1 [23,0 ; 72,2]
Demande psychologique élevée	50,0 [26,0 ; 74,0]
Soutien social faible	44,4 [21,5 ; 69,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	5,6 [0,1 ; 27,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	11,1 [1,4 ; 34,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	38,9 [17,3 ; 64,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,1 [1,4 ; 34,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	22,2 [6,4 ; 47,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,9 [17,3 ; 64,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	22,2 [6,4 ; 47,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	33,3 [13,3 ; 59,0]

HOMMES : Effectif = 75

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	12,0 [5,6 ; 21,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,7 [0,3 ; 9,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	21,3 [11,0 ; 31,6]
Demande psychologique élevée	44,0 [32,8 ; 55,2]
Soutien social faible	33,3 [22,7 ; 44,0]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	9,3 [3,8 ; 18,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	61,3 [50,3 ; 72,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,7 [2,2 ; 14,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,7 [0,3 ; 9,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,4 [1,5 ; 13,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,7 [9,8 ; 27,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,3 [6,6 ; 23,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	8,1 [3,0 ; 16,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,3 [1,5 ; 13,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,0 [0,8 ; 11,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	60,0 [48,9 ; 71,1]

FEMMES : Effectif = 42

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	28,6 [14,9 ; 42,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,4 [0,1 ; 12,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	3,2 [0,1 ; 16,7]
Demande psychologique élevée	45,2 [30,2 ; 60,3]
Soutien social faible	24,4 [12,4 ; 40,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	34,1 [19,6 ; 48,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	97,6 [87,4 ; 99,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,4 [0,1 ; 12,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	7,1 [1,5 ; 19,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	19,0 [8,6 ; 34,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	2,4 [0,1 ; 12,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	97,6 [87,4 ; 99,9]

ENSEMBLE : Effectif = 117

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	17,9 [11,0 ; 24,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,6 [0,5 ; 7,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	15,2 [7,9 ; 22,6]
Demande psychologique élevée	44,4 [35,4 ; 53,4]
Soutien social faible	30,2 [21,8 ; 38,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,1 [11,1 ; 25,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	74,4 [66,4 ; 82,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	4,3 [1,4 ; 9,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,6 [0,5 ; 7,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	6,0 [2,5 ; 12,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,8 [11,7 ; 25,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,5 [4,2 ; 15,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	6,0 [2,5 ; 12,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	3,4 [0,9 ; 8,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,6 [0,5 ; 7,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	73,5 [65,5 ; 81,5]

HOMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Demande psychologique élevée	52,9 [27,8 ; 77,0]
Soutien social faible	31,3 [11,0 ; 58,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	52,9 [27,8 ; 77,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	47,1 [23,0 ; 72,2]

FEMMES : Effectif = 21

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,0 [0,1 ; 24,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	6,3 [0,2 ; 30,2]
Demande psychologique élevée	42,9 [21,8 ; 66,0]
Soutien social faible	20,0 [5,7 ; 43,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	47,6 [26,3 ; 69,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	9,5 [1,2 ; 30,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	90,5 [69,6 ; 98,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,3 [3,0 ; 36,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	9,5 [1,2 ; 30,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	9,5 [1,2 ; 30,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	28,6 [11,3 ; 52,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	4,8 [0,1 ; 23,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,5 [1,2 ; 30,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	90,5 [69,6 ; 98,8]

ENSEMBLE : Effectif = 38

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,5 [4,5 ; 28,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,7 [0,1 ; 14,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	11,1 [2,4 ; 29,2]
Demande psychologique élevée	47,4 [31,5 ; 63,2]
Soutien social faible	25,0 [12,1 ; 42,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	31,6 [16,8 ; 46,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	5,3 [0,6 ; 17,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,6 [0,1 ; 13,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	73,7 [56,9 ; 86,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,9 [1,7 ; 21,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,9 [1,7 ; 21,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	7,9 [1,7 ; 21,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,4 [7,7 ; 34,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	18,9 [8,0 ; 35,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	2,7 [0,1 ; 14,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,9 [1,7 ; 21,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	71,1 [56,6 ; 85,5]

HOMMES : Effectif = 54

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	11,3 [4,3 ; 23,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	12,8 [4,3 ; 27,4]
Demande psychologique élevée	42,6 [29,4 ; 55,8]
Soutien social faible	18,9 [9,4 ; 32,0]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	37,0 [24,2 ; 49,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	1,9 [0,0 ; 9,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	77,8 [66,7 ; 88,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	1,9 [0,0 ; 9,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	9,3 [3,1 ; 20,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,6 [1,2 ; 15,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	16,7 [7,9 ; 29,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	13,0 [5,4 ; 24,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	1,9 [0,0 ; 9,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	72,2 [60,3 ; 84,2]

FEMMES : Effectif = 54

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	15,1 [6,7 ; 27,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	2,4 [0,1 ; 12,9]
Demande psychologique élevée	31,5 [19,1 ; 43,9]
Soutien social faible	14,8 [6,6 ; 27,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	50,0 [36,7 ; 63,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,9 [0,0 ; 9,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	94,4 [84,6 ; 98,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	1,9 [0,0 ; 10,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,7 [1,2 ; 15,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	3,7 [0,5 ; 12,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	7,4 [2,1 ; 17,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	13,5 [5,6 ; 25,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	3,7 [0,5 ; 12,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	92,6 [82,1 ; 97,9]

ENSEMBLE : Effectif = 108

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,2 [6,8 ; 19,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	7,5 [2,8 ; 15,6]
Demande psychologique élevée	37,0 [27,9 ; 46,1]
Soutien social faible	16,8 [9,7 ; 23,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	43,5 [34,2 ; 52,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,9 [0,0 ; 5,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,9 [0,0 ; 5,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	86,1 [79,6 ; 92,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	1,9 [0,2 ; 6,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,5 [3,3 ; 14,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	4,6 [1,5 ; 10,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	12,0 [5,9 ; 18,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	13,2 [6,8 ; 19,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,8 [0,6 ; 7,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	82,4 [75,2 ; 89,6]

HOMMES : Effectif = 8

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 16

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,3 [0,2 ; 30,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Demande psychologique élevée	20,0 [4,3 ; 48,1]
Soutien social faible	35,7 [12,8 ; 64,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	56,3 [29,9 ; 80,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,3 [11,0 ; 58,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	31,3 [11,0 ; 58,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	56,3 [29,9 ; 80,2]

ENSEMBLE : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,2 [0,1 ; 21,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Demande psychologique élevée	34,8 [16,4 ; 57,3]
Soutien social faible	28,6 [11,3 ; 52,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	37,5 [18,8 ; 59,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,2 [0,1 ; 21,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	25,0 [9,8 ; 46,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,5 [2,7 ; 32,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	29,2 [12,6 ; 51,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,2 [0,1 ; 21,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	37,5 [18,8 ; 59,4]

HOMMES : Effectif = 5

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 5

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 10

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,0 [15,7 ; 84,3]
Demande psychologique élevée	30,0 [6,7 ; 65,2]
Soutien social faible	44,4 [13,7 ; 78,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	50,0 [18,7 ; 81,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	10,0 [0,3 ; 44,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	40,0 [12,2 ; 73,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	30,0 [6,7 ; 65,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	50,0 [18,7 ; 81,3]

HOMMES : Effectif = 21

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	4,8 [0,1 ; 23,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	14,3 [3,0 ; 36,3]
Demande psychologique élevée	42,9 [21,8 ; 66,0]
Soutien social faible	15,0 [3,2 ; 37,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	4,8 [0,1 ; 23,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,0 [0,1 ; 24,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	71,4 [47,8 ; 88,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	4,8 [0,1 ; 23,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	4,8 [0,1 ; 23,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	14,3 [3,0 ; 36,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	71,4 [47,8 ; 88,7]

FEMMES : Effectif = 7

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 28

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	3,6 [0,1 ; 18,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	14,8 [4,2 ; 33,7]
Demande psychologique élevée	35,7 [18,0 ; 53,5]
Soutien social faible	11,5 [2,4 ; 30,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	10,7 [2,3 ; 28,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,7 [0,1 ; 19,0]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	78,6 [59,0 ; 91,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	3,6 [0,1 ; 18,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	7,4 [0,9 ; 24,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	3,6 [0,1 ; 18,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	14,3 [4,0 ; 32,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	78,6 [59,0 ; 91,7]

HOMMES : Effectif = 229

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	31,9 [25,8 ; 37,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,4 [2,1 ; 7,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	53,5 [46,8 ; 60,2]
Demande psychologique élevée	36,6 [30,3 ; 42,8]
Soutien social faible	26,1 [20,3 ; 31,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	21,4 [16,1 ; 26,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,1 [1,2 ; 6,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,6 [3,3 ; 9,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	22,3 [16,9 ; 27,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	18,8 [13,7 ; 23,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,3 [4,7 ; 11,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	22,7 [17,3 ; 28,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,2 [31,9 ; 44,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	26,8 [21,0 ; 32,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	46,5 [40,0 ; 53,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	27,1 [21,3 ; 32,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,9 [4,4 ; 11,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	22,3 [16,9 ; 27,7]

FEMMES : Effectif = 163

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	36,2 [28,8 ; 43,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	8,6 [4,3 ; 12,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	24,3 [17,2 ; 31,4]
Demande psychologique élevée	29,6 [22,6 ; 36,7]
Soutien social faible	29,9 [22,8 ; 37,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	36,2 [28,8 ; 43,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,9 [2,1 ; 9,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	47,2 [39,6 ; 54,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,2 [4,8 ; 13,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,9 [2,1 ; 9,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,3 [7,2 ; 17,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	27,0 [20,2 ; 33,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,0 [3,8 ; 12,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	29,4 [22,5 ; 36,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,7 [3,4 ; 11,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,9 [2,1 ; 9,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	47,2 [39,6 ; 54,9]

ENSEMBLE : Effectif = 392

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	33,7 [29,0 ; 38,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,1 [3,7 ; 8,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	42,0 [36,8 ; 47,1]
Demande psychologique élevée	33,7 [29,0 ; 38,4]
Soutien social faible	27,7 [23,2 ; 32,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	27,6 [23,1 ; 32,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,8 [0,7 ; 3,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [3,5 ; 8,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	32,7 [28,0 ; 37,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,8 [11,3 ; 18,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,9 [4,4 ; 9,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	18,4 [14,5 ; 22,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	33,5 [28,8 ; 38,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	19,0 [15,1 ; 22,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	39,3 [34,5 ; 44,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	18,6 [14,8 ; 22,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,6 [4,2 ; 9,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	32,7 [28,0 ; 37,3]

HOMMES : Effectif = 174

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,4 [8,3 ; 18,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,3 [0,6 ; 5,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	40,5 [33,0 ; 48,0]
Demande psychologique élevée	21,8 [15,6 ; 28,0]
Soutien social faible	24,9 [18,3 ; 31,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	10,4 [5,9 ; 15,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,6 [0,0 ; 3,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,6 [2,0 ; 8,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	19,5 [13,6 ; 25,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,9 [3,2 ; 10,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,3 [2,4 ; 9,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	9,2 [4,9 ; 13,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	22,0 [15,8 ; 28,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,9 [8,7 ; 19,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	22,1 [15,9 ; 28,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	14,9 [9,6 ; 20,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,2 [2,4 ; 9,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	18,4 [12,6 ; 24,1]

FEMMES : Effectif = 141

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	19,7 [13,0 ; 26,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,4 [1,6 ; 9,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	15,3 [9,1 ; 21,4]
Demande psychologique élevée	26,5 [19,1 ; 33,9]
Soutien social faible	31,8 [23,7 ; 39,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	37,1 [29,1 ; 45,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,4 [0,2 ; 5,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,9 [0,8 ; 7,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	51,1 [42,8 ; 59,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,6 [3,9 ; 13,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,0 [2,0 ; 10,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,0 [2,0 ; 10,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,8 [12,3 ; 25,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	2,2 [0,5 ; 6,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,6 [19,3 ; 34,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	3,6 [1,2 ; 8,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,4 [4,5 ; 14,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	47,5 [39,2 ; 55,8]

ENSEMBLE : Effectif = 315

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	16,2 [12,1 ; 20,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,2 [1,6 ; 5,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	29,3 [24,1 ; 34,5]
Demande psychologique élevée	23,9 [19,1 ; 28,6]
Soutien social faible	27,9 [22,8 ; 32,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,4 [17,7 ; 27,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,0 [0,2 ; 2,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,8 [1,7 ; 6,0]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	33,5 [28,3 ; 38,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,7 [4,7 ; 10,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,1 [2,7 ; 7,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	7,3 [4,5 ; 10,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,6 [16,1 ; 25,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,7 [5,6 ; 11,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	24,1 [19,4 ; 28,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,9 [6,6 ; 13,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,1 [4,2 ; 9,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	31,3 [26,2 ; 36,4]

HOMMES : Effectif = 15

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	6,7 [0,2 ; 31,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,7 [0,2 ; 31,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,0 [23,0 ; 77,0]
Demande psychologique élevée	0,0
Soutien social faible	14,3 [1,8 ; 42,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	13,3 [1,7 ; 40,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	13,3 [1,7 ; 40,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,1 [0,2 ; 33,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	7,1 [0,2 ; 33,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [4,3 ; 48,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	20,0 [4,3 ; 48,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	13,3 [1,7 ; 40,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,7 [0,2 ; 31,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	13,3 [1,7 ; 40,5]

FEMMES : Effectif = 20

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	5,0 [0,1 ; 24,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	31,3 [11,0 ; 58,7]
Demande psychologique élevée	30,0 [11,9 ; 54,3]
Soutien social faible	25,0 [8,7 ; 49,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	30,0 [11,9 ; 54,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	15,0 [3,2 ; 37,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	25,0 [8,7 ; 49,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,0 [0,1 ; 24,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,0 [1,2 ; 31,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	21,1 [6,1 ; 45,6]

ENSEMBLE : Effectif = 35

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	5,7 [0,7 ; 19,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,9 [0,1 ; 14,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	40,0 [22,5 ; 57,5]
Demande psychologique élevée	17,1 [6,6 ; 33,6]
Soutien social faible	20,6 [8,7 ; 37,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,9 [10,4 ; 40,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,1 [6,6 ; 33,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,8 [1,9 ; 23,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,8 [1,9 ; 23,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [8,4 ; 36,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	17,1 [6,6 ; 33,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	20,0 [8,4 ; 36,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,7 [0,7 ; 19,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,7 [0,7 ; 19,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,6 [6,8 ; 34,5]

HOMMES : Effectif = 72

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	21,1 [11,6 ; 30,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,8 [0,3 ; 9,8]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,7 [39,0 ; 64,3]
Demande psychologique élevée	34,3 [23,2 ; 45,4]
Soutien social faible	24,3 [14,2 ; 34,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	13,9 [6,9 ; 24,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	1,4 [0,0 ; 7,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	7,1 [2,4 ; 15,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,7 [4,0 ; 19,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,2 [0,9 ; 11,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	15,3 [7,0 ; 23,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	22,5 [12,8 ; 32,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	7,0 [2,3 ; 15,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,8 [16,5 ; 37,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,0 [2,3 ; 15,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	1,4 [0,0 ; 7,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	7,1 [2,4 ; 15,9]

FEMMES : Effectif = 236

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,7 [9,2 ; 18,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,4 [0,0 ; 2,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	35,6 [29,1 ; 42,2]
Demande psychologique élevée	27,2 [21,4 ; 32,9]
Soutien social faible	24,8 [19,1 ; 30,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,4 [13,4 ; 23,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,3 [0,3 ; 3,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,6 [1,0 ; 5,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	14,6 [10,1 ; 19,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,8 [6,8 ; 14,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,8 [1,8 ; 7,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	18,0 [13,1 ; 23,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	28,2 [22,4 ; 34,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	3,9 [1,8 ; 7,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,0 [20,3 ; 31,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	3,4 [1,5 ; 6,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,3 [2,1 ; 7,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	14,6 [10,1 ; 19,1]

ENSEMBLE : Effectif = 308

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	15,5 [11,4 ; 19,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	1,0 [0,2 ; 2,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	39,2 [33,4 ; 45,1]
Demande psychologique élevée	28,8 [23,7 ; 33,9]
Soutien social faible	24,7 [19,7 ; 29,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	17,3 [13,1 ; 21,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,0 [0,2 ; 2,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,3 [0,9 ; 4,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	12,9 [9,1 ; 16,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,5 [7,1 ; 14,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,9 [1,7 ; 6,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,4 [13,1 ; 21,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	26,9 [21,9 ; 31,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	4,6 [2,2 ; 7,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,2 [21,2 ; 31,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	4,3 [2,0 ; 6,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	3,6 [1,8 ; 6,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	12,9 [9,1 ; 16,6]

HOMMES : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	46,2 [19,2 ; 74,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	15,4 [1,9 ; 45,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]
Demande psychologique élevée	23,1 [5,0 ; 53,8]
Soutien social faible	38,5 [13,9 ; 68,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	0,0

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	38,5 [13,9 ; 68,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	38,5 [13,9 ; 68,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	23,1 [5,0 ; 53,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	0,0

FEMMES : Effectif = 4

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	41,2 [18,4 ; 67,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,8 [1,5 ; 36,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	20,0 [4,3 ; 48,1]
Demande psychologique élevée	29,4 [10,3 ; 56,0]
Soutien social faible	35,3 [14,2 ; 61,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	35,3 [14,2 ; 61,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	29,4 [10,3 ; 56,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]

HOMMES : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,0 [2,5 ; 55,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	22,2 [2,8 ; 60,0]
Demande psychologique élevée	40,0 [12,2 ; 73,8]
Soutien social faible	40,0 [12,2 ; 73,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	18,2 [2,3 ; 51,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	27,3 [6,0 ; 61,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	9,1 [0,2 ; 41,3]

FEMMES : Effectif = 29

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	23,1 [9,0 ; 43,6]
Demande psychologique élevée	31,0 [15,3 ; 50,8]
Soutien social faible	25,9 [11,1 ; 46,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,1 [10,3 ; 43,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,7 [8,0 ; 39,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,3 [2,2 ; 27,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,9 [0,8 ; 22,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	3,4 [0,1 ; 17,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	14,3 [4,0 ; 32,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	24,1 [10,3 ; 43,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	3,4 [0,1 ; 17,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	20,7 [8,0 ; 39,7]

ENSEMBLE : Effectif = 40

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	12,8 [4,3 ; 27,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	22,9 [10,4 ; 40,1]
Demande psychologique élevée	33,3 [18,5 ; 48,1]
Soutien social faible	29,7 [15,0 ; 44,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	25,0 [12,7 ; 41,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,5 [0,1 ; 13,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,5 [7,3 ; 32,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,5 [4,2 ; 26,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,5 [1,6 ; 20,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	2,5 [0,1 ; 13,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	17,9 [7,5 ; 33,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	5,0 [0,6 ; 16,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	25,0 [12,7 ; 41,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	2,5 [0,1 ; 13,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,0 [0,6 ; 16,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,5 [7,3 ; 32,8]

HOMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,5 [6,8 ; 49,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	17,6 [3,8 ; 43,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	46,7 [21,3 ; 73,4]
Demande psychologique élevée	17,6 [3,8 ; 43,4]
Soutien social faible	23,5 [6,8 ; 49,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	23,5 [6,8 ; 49,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	35,3 [14,2 ; 61,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,6 [3,8 ; 43,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	23,5 [6,8 ; 49,9]

FEMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,5 [6,8 ; 49,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,9 [0,1 ; 28,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	26,7 [7,8 ; 55,1]
Demande psychologique élevée	25,0 [7,3 ; 52,4]
Soutien social faible	20,0 [4,3 ; 48,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	52,9 [27,8 ; 77,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	11,8 [1,5 ; 36,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,9 [0,1 ; 28,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	52,9 [27,8 ; 77,0]

ENSEMBLE : Effectif = 34

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,5 [10,7 ; 41,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,8 [3,3 ; 27,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	36,7 [19,4 ; 53,9]
Demande psychologique élevée	21,2 [9,0 ; 38,9]
Soutien social faible	21,9 [9,3 ; 40,0]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	14,7 [5,0 ; 31,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,8 [1,9 ; 23,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	44,1 [27,4 ; 60,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	5,9 [0,7 ; 19,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,9 [0,7 ; 19,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	11,8 [3,3 ; 27,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	8,8 [1,9 ; 23,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	5,9 [0,7 ; 19,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	11,8 [3,3 ; 27,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	2,9 [0,1 ; 15,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,8 [1,9 ; 23,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	38,2 [21,9 ; 54,6]

HOMMES : Effectif = 3

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 23

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	65,2 [42,7 ; 83,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,3 [0,1 ; 21,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	4,8 [0,1 ; 23,8]
Demande psychologique élevée	30,4 [13,2 ; 52,9]
Soutien social faible	21,7 [7,5 ; 43,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	56,5 [36,3 ; 76,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	30,4 [13,2 ; 52,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	0,0

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	73,9 [51,6 ; 89,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,7 [1,1 ; 28,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	52,2 [31,8 ; 72,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	91,3 [72,0 ; 98,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	43,5 [23,2 ; 63,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	91,3 [72,0 ; 98,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	30,4 [13,2 ; 52,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	21,7 [7,5 ; 43,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	0,0

ENSEMBLE : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	57,7 [38,7 ; 76,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,8 [0,1 ; 19,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	4,2 [0,1 ; 21,1]
Demande psychologique élevée	26,9 [11,6 ; 47,8]
Soutien social faible	19,2 [6,6 ; 39,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	50,0 [30,8 ; 69,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	26,9 [11,6 ; 47,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	0,0

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	65,4 [44,3 ; 82,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,7 [0,9 ; 25,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	46,2 [27,0 ; 65,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	88,5 [69,8 ; 97,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	42,3 [23,3 ; 61,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	88,5 [69,8 ; 97,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	26,9 [11,6 ; 47,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	20,0 [6,8 ; 40,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	0,0

Nomenclature économique de synthèse NES 1994-2007

HOMMES : Effectif = 41

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	36,6 [21,8 ; 51,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,3 [1,5 ; 19,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	65,6 [49,2 ; 82,1]
Demande psychologique élevée	18,4 [7,7 ; 34,3]
Soutien social faible	17,6 [6,8 ; 34,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,0 [10,6 ; 37,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	9,8 [2,7 ; 23,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	0,0

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,2 [4,1 ; 26,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,5 [1,6 ; 20,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,6 [5,6 ; 29,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	47,5 [32,0 ; 63,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	14,6 [5,6 ; 29,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	43,9 [28,7 ; 59,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,8 [2,7 ; 23,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,3 [1,5 ; 19,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	0,0

FEMMES : Effectif = 30

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	66,7 [47,2 ; 82,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	30,0 [14,7 ; 49,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	56,0 [36,5 ; 75,5]
Demande psychologique élevée	24,1 [10,3 ; 43,5]
Soutien social faible	37,9 [20,3 ; 55,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	43,3 [25,6 ; 61,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,7 [0,8 ; 22,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	10,0 [2,1 ; 26,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	23,3 [9,9 ; 42,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	13,3 [3,8 ; 30,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	26,7 [12,3 ; 45,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	33,3 [17,3 ; 52,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	6,7 [0,8 ; 22,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	66,7 [47,2 ; 82,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	13,3 [3,8 ; 30,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	10,0 [2,1 ; 26,5]

ENSEMBLE : Effectif = 71

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	49,3 [37,7 ; 60,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	16,9 [8,2 ; 25,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	61,4 [48,8 ; 74,0]
Demande psychologique élevée	20,9 [11,2 ; 30,6]
Soutien social faible	27,0 [16,0 ; 37,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	31,0 [20,2 ; 41,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,5 [3,2 ; 17,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	4,2 [0,9 ; 11,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	16,9 [8,2 ; 25,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	10,0 [4,1 ; 19,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	19,7 [10,5 ; 29,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	41,4 [29,9 ; 53,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,3 [5,0 ; 21,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	53,5 [41,9 ; 65,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,6 [1,6 ; 13,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,9 [4,1 ; 19,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	4,2 [0,9 ; 11,9]

HOMMES : Effectif = 183

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	31,7 [25,0 ; 38,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	13,1 [8,2 ; 18,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	56,1 [48,3 ; 63,9]
Demande psychologique élevée	29,7 [23,0 ; 36,3]
Soutien social faible	24,2 [18,0 ; 30,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	23,2 [17,1 ; 29,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,5 [0,0 ; 3,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,9 [1,6 ; 7,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	11,0 [6,4 ; 15,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,4 [9,3 ; 19,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,8 [0,9 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,7 [7,9 ; 17,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	32,6 [25,8 ; 39,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	13,3 [8,3 ; 18,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	35,2 [28,2 ; 42,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,8 [4,7 ; 13,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,1 [3,1 ; 10,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,3 [4,3 ; 12,3]

FEMMES : Effectif = 113

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	46,9 [37,7 ; 56,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,5 [5,6 ; 17,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	42,3 [32,4 ; 52,1]
Demande psychologique élevée	33,0 [24,3 ; 41,7]
Soutien social faible	33,3 [24,6 ; 42,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	31,0 [22,4 ; 39,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,9 [0,0 ; 4,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,3 [2,0 ; 11,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	29,2 [20,8 ; 37,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	17,7 [10,7 ; 24,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,2 [2,5 ; 12,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,2 [7,7 ; 20,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	45,0 [35,8 ; 54,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	9,7 [5,0 ; 16,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	43,8 [34,6 ; 52,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,3 [2,0 ; 11,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,5 [5,6 ; 17,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	29,2 [20,8 ; 37,6]

ENSEMBLE : Effectif = 296

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	37,5 [32,0 ; 43,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	12,5 [8,7 ; 16,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,8 [44,6 ; 57,0]
Demande psychologique élevée	31,0 [25,7 ; 36,2]
Soutien social faible	27,6 [22,5 ; 32,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	26,2 [21,2 ; 31,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,7 [0,1 ; 2,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,4 [2,1 ; 6,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	18,0 [13,6 ; 22,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	15,6 [11,5 ; 19,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,1 [1,8 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	13,3 [9,4 ; 17,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	37,3 [31,8 ; 42,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,9 [8,2 ; 15,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	38,4 [32,9 ; 44,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,5 [4,5 ; 10,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,2 [5,0 ; 11,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,3 [12,1 ; 20,6]

HOMMES : Effectif = 103

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	33,3 [24,0 ; 42,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,1 [2,3 ; 12,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	61,5 [51,5 ; 71,5]
Demande psychologique élevée	24,3 [16,0 ; 32,6]
Soutien social faible	30,7 [21,7 ; 39,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	30,1 [21,2 ; 39,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,9 [1,1 ; 9,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,8 [2,2 ; 12,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,4 [12,6 ; 28,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,6 [7,8 ; 21,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,9 [1,6 ; 11,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	21,4 [13,4 ; 29,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	49,5 [39,9 ; 59,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	22,5 [14,4 ; 30,7]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	47,1 [37,4 ; 56,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	19,4 [11,8 ; 27,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	18,4 [11,0 ; 25,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	18,4 [11,0 ; 25,9]

FEMMES : Effectif = 116

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	52,2 [43,0 ; 61,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	16,5 [9,7 ; 23,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	29,3 [20,0 ; 38,7]
Demande psychologique élevée	25,4 [17,4 ; 33,4]
Soutien social faible	23,0 [15,2 ; 30,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	62,9 [54,1 ; 71,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,9 [3,0 ; 13,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	27,6 [19,5 ; 35,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,8 [3,6 ; 14,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,3 [1,4 ; 9,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	13,8 [7,5 ; 20,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	39,7 [30,8 ; 48,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	6,9 [3,0 ; 13,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,0 [44,8 ; 63,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,9 [3,0 ; 13,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	26,3 [18,2 ; 34,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	25,0 [17,1 ; 32,9]

ENSEMBLE : Effectif = 219

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	43,5 [36,8 ; 50,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	11,7 [7,4 ; 16,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	45,4 [38,1 ; 52,6]
Demande psychologique élevée	24,9 [19,1 ; 30,6]
Soutien social faible	26,6 [20,7 ; 32,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	47,5 [40,9 ; 54,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,8 [0,5 ; 4,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,4 [3,2 ; 9,6]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	24,2 [18,5 ; 29,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,0 [6,8 ; 15,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,6 [2,2 ; 8,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,4 [12,3 ; 22,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	44,3 [37,7 ; 50,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	14,2 [9,6 ; 18,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	50,7 [44,0 ; 57,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	12,8 [8,4 ; 17,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	22,6 [17,0 ; 28,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	21,9 [16,4 ; 27,4]

HOMMES : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	25,4 [14,6 ; 36,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,3 [1,8 ; 15,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	52,6 [39,7 ; 65,6]
Demande psychologique élevée	17,7 [8,2 ; 27,3]
Soutien social faible	32,8 [21,0 ; 44,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	19,4 [9,5 ; 29,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,2 [0,4 ; 11,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,5 [1,8 ; 15,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,7 [8,2 ; 27,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,7 [3,6 ; 19,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,8 [1,0 ; 13,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	19,4 [9,5 ; 29,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	51,6 [39,2 ; 64,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	27,4 [16,3 ; 38,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,1 [41,6 ; 66,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	22,6 [12,2 ; 33,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,3 [4,7 ; 21,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,1 [8,0 ; 27,7]

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 65

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	26,2 [15,5 ; 36,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,7 [2,5 ; 17,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,7 [38,9 ; 64,6]
Demande psychologique élevée	18,8 [9,2 ; 28,3]
Soutien social faible	34,9 [23,1 ; 46,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,3 [10,5 ; 30,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,1 [0,4 ; 10,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,3 [1,7 ; 15,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,2 [7,9 ; 26,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,4 [3,5 ; 19,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,3 [1,7 ; 15,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	20,3 [10,5 ; 30,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	50,0 [37,8 ; 62,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	28,1 [17,1 ; 39,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	54,0 [41,7 ; 66,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	23,4 [13,1 ; 33,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	12,5 [5,6 ; 23,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,6 [7,8 ; 26,9]

HOMMES : Effectif = 178

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	16,4 [10,9 ; 21,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	1,7 [0,4 ; 4,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	47,9 [40,3 ; 55,5]
Demande psychologique élevée	34,3 [27,3 ; 41,3]
Soutien social faible	24,2 [17,9 ; 30,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	25,8 [19,4 ; 32,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,1 [0,1 ; 4,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,7 [3,1 ; 10,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	28,8 [22,1 ; 35,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	14,0 [8,9 ; 19,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,1 [2,3 ; 9,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,9 [11,4 ; 22,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	36,0 [28,9 ; 43,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	22,5 [16,3 ; 28,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	33,5 [26,5 ; 40,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	19,7 [13,8 ; 25,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,5 [2,0 ; 8,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	28,1 [21,5 ; 34,7]

FEMMES : Effectif = 65

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	46,9 [34,6 ; 59,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	18,8 [9,2 ; 28,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	31,6 [19,5 ; 43,6]
Demande psychologique élevée	31,7 [20,3 ; 43,2]
Soutien social faible	30,6 [19,2 ; 42,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	53,1 [40,9 ; 65,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,5 [0,0 ; 8,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,1 [0,4 ; 10,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	49,2 [37,1 ; 61,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,2 [1,7 ; 15,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,1 [0,4 ; 10,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	6,2 [1,7 ; 15,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,0 [28,1 ; 51,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	7,7 [2,5 ; 17,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	36,9 [25,2 ; 48,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	4,6 [1,0 ; 12,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	9,2 [3,5 ; 19,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	46,2 [34,0 ; 58,3]

ENSEMBLE : Effectif = 243

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	24,5 [19,1 ; 29,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,2 [3,2 ; 9,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	43,7 [37,2 ; 50,2]
Demande psychologique élevée	33,6 [27,6 ; 39,6]
Soutien social faible	25,8 [20,3 ; 31,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	33,1 [27,1 ; 39,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,3 ; 3,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,8 [2,8 ; 8,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	34,3 [28,3 ; 40,3]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,9 [7,9 ; 16,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,5 [2,3 ; 8,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,0 [9,6 ; 18,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	37,0 [31,0 ; 43,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	18,5 [13,6 ; 23,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	34,4 [28,4 ; 40,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	15,6 [11,1 ; 20,2]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,8 [2,8 ; 8,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	32,9 [27,0 ; 38,8]

HOMMES : Effectif = 312

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,4 [18,7 ; 28,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,5 [1,8 ; 6,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,5 [45,8 ; 57,3]
Demande psychologique élevée	26,4 [21,5 ; 31,3]
Soutien social faible	27,5 [22,5 ; 32,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	20,2 [15,7 ; 24,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,6 [0,5 ; 3,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,4 [4,5 ; 10,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,5 [16,0 ; 25,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,7 [5,5 ; 11,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,2 [1,5 ; 5,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	19,2 [14,9 ; 23,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	30,2 [25,1 ; 35,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	21,2 [16,7 ; 25,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	40,8 [35,3 ; 46,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	24,7 [19,9 ; 29,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,3 [6,9 ; 13,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	19,2 [14,9 ; 23,6]

FEMMES : Effectif = 101

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	47,5 [37,8 ; 57,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	13,9 [7,1 ; 20,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	32,3 [22,8 ; 41,8]
Demande psychologique élevée	35,6 [26,3 ; 45,0]
Soutien social faible	30,3 [21,3 ; 39,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	43,6 [33,9 ; 53,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	11,9 [5,6 ; 18,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	30,7 [21,7 ; 39,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,9 [6,3 ; 19,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,0 [1,6 ; 11,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	23,8 [15,5 ; 32,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	40,6 [31,0 ; 50,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	11,0 [5,6 ; 18,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	46,5 [36,6 ; 56,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,0 [1,6 ; 11,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	19,8 [12,0 ; 27,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	29,7 [20,8 ; 38,6]

ENSEMBLE : Effectif = 413

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	29,3 [24,9 ; 33,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,1 [3,8 ; 8,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	46,9 [41,9 ; 51,9]
Demande psychologique élevée	28,6 [24,3 ; 33,0]
Soutien social faible	28,2 [23,8 ; 32,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	25,9 [21,7 ; 30,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,4 ; 2,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,5 [5,8 ; 11,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	23,0 [18,9 ; 27,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,7 [6,8 ; 12,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,6 [1,8 ; 5,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	20,3 [16,5 ; 24,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	32,8 [28,2 ; 37,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	18,7 [15,0 ; 22,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	42,2 [37,4 ; 46,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	19,9 [16,0 ; 23,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	12,6 [9,4 ; 15,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	21,8 [17,8 ; 25,8]

HOMMES : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	58,3 [27,7 ; 84,8]
Demande psychologique élevée	33,3 [9,9 ; 65,1]
Soutien social faible	25,0 [5,5 ; 57,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	33,3 [9,9 ; 65,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	58,3 [27,7 ; 84,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]

FEMMES : Effectif = 0

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

ENSEMBLE : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	58,3 [27,7 ; 84,8]
Demande psychologique élevée	33,3 [9,9 ; 65,1]
Soutien social faible	25,0 [5,5 ; 57,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	33,3 [9,9 ; 65,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	25,0 [5,5 ; 57,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	58,3 [27,7 ; 84,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	41,7 [15,2 ; 72,3]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	16,7 [2,1 ; 48,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,3 [0,2 ; 38,5]

HOMMES : Effectif = 189

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,2 [14,5 ; 26,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	57,7 [50,4 ; 65,0]
Demande psychologique élevée	22,3 [16,4 ; 28,3]
Soutien social faible	20,9 [15,0 ; 26,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,1 [12,6 ; 23,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,2 [1,2 ; 6,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	7,4 [3,7 ; 11,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	8,0 [4,1 ; 11,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	30,6 [24,0 ; 37,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	9,6 [5,4 ; 13,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	25,5 [19,3 ; 31,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	47,3 [40,2 ; 54,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	34,2 [27,4 ; 41,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	48,4 [41,1 ; 55,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	42,0 [35,0 ; 49,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,0 [4,1 ; 11,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,0 [4,1 ; 11,9]

FEMMES : Effectif = 25

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,0 [6,8 ; 40,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,0 [0,1 ; 20,4]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	14,3 [3,0 ; 36,3]
Demande psychologique élevée	20,0 [6,8 ; 40,7]
Soutien social faible	29,2 [12,6 ; 51,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,0 [9,4 ; 45,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	80,0 [59,3 ; 93,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,0 [0,1 ; 20,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,0 [6,8 ; 40,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	16,0 [4,5 ; 36,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,0 [0,1 ; 20,4]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	76,0 [54,9 ; 90,6]

ENSEMBLE : Effectif = 214

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	20,2 [14,8 ; 25,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,5 [0,0 ; 2,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	53,1 [46,1 ; 60,0]
Demande psychologique élevée	22,1 [16,5 ; 27,6]
Soutien social faible	21,8 [16,2 ; 27,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	18,8 [13,5 ; 24,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,8 [1,0 ; 6,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,6 [3,2 ; 9,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	16,4 [11,5 ; 21,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	27,0 [21,0 ; 33,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,9 [5,1 ; 12,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	23,5 [17,8 ; 29,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	44,1 [37,5 ; 50,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	31,1 [24,9 ; 37,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	44,5 [37,8 ; 51,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	37,1 [30,6 ; 43,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	7,5 [4,0 ; 11,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	16,0 [11,0 ; 20,9]

HOMMES : Effectif = 242

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	17,0 [12,3 ; 21,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,9 [1,2 ; 5,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	52,6 [46,2 ; 59,1]
Demande psychologique élevée	21,0 [15,8 ; 26,2]
Soutien social faible	28,5 [22,7 ; 34,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,6 [11,9 ; 21,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,1 [0,7 ; 4,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,3 [1,4 ; 6,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	19,9 [14,9 ; 25,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	19,5 [14,5 ; 24,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,3 [1,4 ; 6,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,6 [11,9 ; 21,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	33,8 [27,8 ; 39,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	27,0 [21,4 ; 32,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	32,6 [26,6 ; 38,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	17,0 [12,3 ; 21,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,7 [3,5 ; 9,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	19,1 [14,1 ; 24,0]

FEMMES : Effectif = 237

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	30,8 [24,9 ; 36,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,9 [2,9 ; 8,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	41,5 [34,7 ; 48,2]
Demande psychologique élevée	24,2 [18,7 ; 29,6]
Soutien social faible	26,6 [20,9 ; 32,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	27,1 [21,4 ; 32,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,7 [0,5 ; 4,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [2,9 ; 8,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	37,3 [31,1 ; 43,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	16,9 [12,1 ; 21,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,6 [2,3 ; 8,2]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,8 [10,3 ; 19,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	36,7 [30,6 ; 42,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	2,5 [0,9 ; 5,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	22,4 [17,1 ; 27,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	1,3 [0,3 ; 3,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,8 [3,6 ; 10,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	37,3 [31,1 ; 43,5]

ENSEMBLE : Effectif = 479

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,8 [20,0 ; 27,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,4 [2,6 ; 6,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	47,3 [42,6 ; 52,0]
Demande psychologique élevée	22,6 [18,8 ; 26,3]
Soutien social faible	27,5 [23,5 ; 31,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	21,8 [18,1 ; 25,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,9 [0,9 ; 3,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,6 [2,7 ; 6,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	28,5 [24,5 ; 32,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	18,2 [14,7 ; 21,7]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,0 [2,2 ; 5,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	15,7 [12,4 ; 19,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	35,2 [30,9 ; 39,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	14,9 [11,7 ; 18,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	27,5 [23,5 ; 31,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,2 [6,6 ; 11,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,7 [4,5 ; 9,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	28,1 [24,1 ; 32,1]

HOMMES : Effectif = 77

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	26,0 [16,2 ; 35,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,8 [2,9 ; 16,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	61,6 [50,5 ; 72,8]
Demande psychologique élevée	18,2 [9,6 ; 26,8]
Soutien social faible	28,0 [17,8 ; 38,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	6,5 [2,1 ; 14,5]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,3 [0,0 ; 7,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	6,5 [2,1 ; 14,5]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	11,7 [5,5 ; 21,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	16,9 [8,5 ; 25,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	2,6 [0,3 ; 9,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,3 [7,4 ; 24,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	46,1 [34,8 ; 57,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	10,4 [4,6 ; 19,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	15,8 [7,6 ; 24,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,5 [2,1 ; 14,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,6 [0,3 ; 9,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	10,4 [4,6 ; 19,4]

FEMMES : Effectif = 25

% de salariées exposées à chaque facteur parmi les salariées répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	16,0 [4,5 ; 36,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	8,0 [1,0 ; 26,0]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	8,7 [1,1 ; 28,0]
Demande psychologique élevée	20,0 [6,8 ; 40,7]
Soutien social faible	12,5 [2,7 ; 32,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	16,0 [4,5 ; 36,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	4,0 [0,1 ; 20,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,0 [0,1 ; 20,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	56,0 [36,5 ; 75,5]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	0,0
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	16,7 [4,7 ; 37,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	20,8 [7,1 ; 42,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,0 [1,0 ; 26,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	52,0 [32,4 ; 71,6]

ENSEMBLE : Effectif = 102

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	23,5 [15,3 ; 31,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,8 [3,4 ; 14,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	49,0 [39,0 ; 59,0]
Demande psychologique élevée	18,6 [11,1 ; 26,2]
Soutien social faible	24,2 [15,8 ; 32,7]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	8,8 [4,1 ; 16,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,0 [0,2 ; 6,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	5,9 [2,2 ; 12,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	22,5 [14,4 ; 30,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,7 [6,3 ; 19,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,9 [1,1 ; 9,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,7 [6,3 ; 19,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	39,0 [29,4 ; 48,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	7,9 [3,5 ; 15,0]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	17,0 [9,6 ; 24,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	6,9 [2,8 ; 13,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	2,0 [0,2 ; 7,0]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	20,6 [12,7 ; 28,4]

HOMMES : Effectif = 75

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	12,2 [5,7 ; 21,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,0
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	13,0 [5,4 ; 24,9]
Demande psychologique élevée	45,3 [34,1 ; 56,6]
Soutien social faible	20,5 [11,3 ; 29,8]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	32,0 [21,4 ; 42,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,7 [0,3 ; 9,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	70,7 [60,4 ; 81,0]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	1,3 [0,0 ; 7,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,0 [3,0 ; 16,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,3 [1,5 ; 13,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	16,0 [7,7 ; 24,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	10,7 [4,7 ; 19,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,0 [0,8 ; 11,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	65,3 [54,6 ; 76,1]

FEMMES : Effectif = 76

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	16,2 [7,8 ; 24,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	1,4 [0,0 ; 7,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	3,4 [0,4 ; 11,9]
Demande psychologique élevée	34,2 [23,5 ; 44,9]
Soutien social faible	16,0 [7,7 ; 24,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	48,7 [37,4 ; 59,9]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	3,9 [0,8 ; 11,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	93,4 [85,3 ; 97,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	5,3 [1,5 ; 13,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,7 [2,2 ; 14,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,3 [1,5 ; 12,9]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	14,5 [7,5 ; 24,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	17,8 [9,0 ; 26,6]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	1,3 [0,0 ; 7,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,6 [2,2 ; 14,7]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	92,1 [83,6 ; 97,0]

ENSEMBLE : Effectif = 151

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	14,2 [8,6 ; 19,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,7 [0,0 ; 3,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	8,0 [3,7 ; 14,7]
Demande psychologique élevée	39,7 [31,9 ; 47,5]
Soutien social faible	18,2 [12,0 ; 24,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	40,4 [32,6 ; 48,2]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,0 [0,4 ; 5,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	1,3 [0,2 ; 4,7]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	82,1 [76,0 ; 88,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	3,3 [1,1 ; 7,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	7,3 [3,7 ; 12,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	5,3 [2,3 ; 10,2]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	15,2 [9,5 ; 21,0]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	0,0

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	14,2 [8,6 ; 19,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,7 [0,0 ; 3,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,3 [2,3 ; 10,2]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	78,8 [72,3 ; 85,3]

HOMMES : Effectif = 8

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour

Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs

Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour

Demande psychologique élevée

Soutien social faible

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour

Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour

Travail sur écran plus de 4 heures par jour

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour

Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour

Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour

Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour

Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour

Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour

Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour

FEMMES : Effectif = 16

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,3 [0,2 ; 30,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	15,4 [1,9 ; 45,4]
Demande psychologique élevée	20,0 [4,3 ; 48,1]
Soutien social faible	35,7 [12,8 ; 64,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	56,3 [29,9 ; 80,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,3 [11,0 ; 58,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,5 [1,6 ; 38,3]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	31,3 [11,0 ; 58,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	0,0
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	0,0
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	56,3 [29,9 ; 80,2]

ENSEMBLE : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,2 [0,1 ; 21,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	20,0 [5,7 ; 43,7]
Demande psychologique élevée	34,8 [16,4 ; 57,3]
Soutien social faible	28,6 [11,3 ; 52,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	0,0
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	37,5 [18,8 ; 59,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,2 [0,1 ; 21,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	25,0 [9,8 ; 46,7]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	12,5 [2,7 ; 32,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	29,2 [12,6 ; 51,1]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	8,3 [1,0 ; 27,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,2 [0,1 ; 21,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	37,5 [18,8 ; 59,4]

HOMMES : Effectif = 347

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	25,9 [21,3 ; 30,5]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	4,0 [2,0 ; 6,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	43,4 [37,9 ; 48,8]
Demande psychologique élevée	38,0 [32,8 ; 43,1]
Soutien social faible	27,8 [23,0 ; 32,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	17,6 [13,6 ; 21,6]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	2,0 [0,8 ; 4,1]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,6 [2,4 ; 6,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	32,9 [27,9 ; 37,8]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	15,3 [11,5 ; 19,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,6 [4,0 ; 9,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,7 [13,7 ; 21,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,5 [26,6 ; 36,4]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	22,5 [18,1 ; 26,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	35,9 [30,8 ; 40,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	20,7 [16,5 ; 25,0]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,1 [3,5 ; 8,6]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	32,6 [27,6 ; 37,5]

FEMMES : Effectif = 226

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	32,3 [26,2 ; 38,4]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,6 [3,4 ; 9,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	19,1 [13,5 ; 24,8]
Demande psychologique élevée	32,4 [26,3 ; 38,6]
Soutien social faible	27,5 [21,6 ; 33,5]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	36,0 [29,7 ; 42,3]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,5 [1,5 ; 6,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	60,2 [53,8 ; 66,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	6,6 [3,4 ; 9,9]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	4,0 [1,8 ; 7,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	10,2 [6,2 ; 14,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	23,9 [18,3 ; 29,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	5,8 [2,7 ; 8,8]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	23,5 [17,9 ; 29,0]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	4,9 [2,5 ; 8,5]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	3,5 [1,5 ; 6,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	60,2 [53,8 ; 66,6]

ENSEMBLE : Effectif = 573

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	28,4 [24,8 ; 32,1]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	5,1 [3,3 ; 6,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	34,4 [30,2 ; 38,5]
Demande psychologique élevée	35,8 [31,9 ; 39,7]
Soutien social faible	27,7 [24,0 ; 31,4]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,8 [21,3 ; 28,4]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,5 ; 2,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,2 [2,6 ; 5,8]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	43,6 [39,6 ; 47,7]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	11,9 [9,2 ; 14,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,6 [3,7 ; 7,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,7 [11,8 ; 17,6]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	28,5 [24,8 ; 32,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	15,9 [12,9 ; 18,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	30,9 [27,1 ; 34,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	14,5 [11,6 ; 17,4]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,1 [3,3 ; 6,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	43,5 [39,4 ; 47,5]

HOMMES : Effectif = 57

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	21,4 [10,7 ; 32,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	8,9 [3,0 ; 19,6]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	50,9 [37,5 ; 64,4]
Demande psychologique élevée	40,4 [27,6 ; 53,1]
Soutien social faible	32,7 [20,3 ; 45,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	24,6 [13,4 ; 35,7]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,8 [0,0 ; 9,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	8,8 [2,9 ; 19,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	17,5 [8,7 ; 29,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,0 [1,9 ; 17,0]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,3 [1,1 ; 14,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	22,8 [11,9 ; 33,7]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	31,6 [19,5 ; 43,6]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	17,5 [8,7 ; 29,9]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	36,8 [24,3 ; 49,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	5,3 [1,1 ; 14,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	12,5 [5,2 ; 24,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	10,5 [4,0 ; 21,5]

FEMMES : Effectif = 89

% de salariées exposées à chaque facteur parmi les salariées répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	40,4 [30,3 ; 50,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	6,8 [2,5 ; 14,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	25,3 [15,7 ; 34,9]
Demande psychologique élevée	29,9 [20,3 ; 39,5]
Soutien social faible	27,7 [18,1 ; 37,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	28,4 [19,0 ; 37,8]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	12,5 [6,4 ; 21,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	22,5 [13,8 ; 31,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	28,4 [19,0 ; 37,8]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	8,0 [3,3 ; 15,7]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	25,0 [16,0 ; 34,0]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	50,6 [40,2 ; 60,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	16,9 [9,1 ; 24,6]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	50,0 [39,6 ; 60,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,0 [4,0 ; 16,9]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	10,1 [4,7 ; 18,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	22,5 [13,8 ; 31,1]

ENSEMBLE : Effectif = 146

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	33,1 [25,4 ; 40,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	7,6 [3,9 ; 13,3]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	35,6 [27,4 ; 43,8]
Demande psychologique élevée	34,0 [26,3 ; 41,8]
Soutien social faible	29,7 [22,1 ; 37,3]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	26,9 [19,7 ; 34,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,7 [0,0 ; 3,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	11,0 [5,9 ; 16,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	20,5 [14,0 ; 27,1]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	20,0 [13,5 ; 26,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	6,9 [3,4 ; 12,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	24,1 [17,2 ; 31,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	43,2 [35,1 ; 51,2]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	17,1 [11,0 ; 23,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	44,8 [36,7 ; 52,9]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,5 [3,8 ; 13,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	11,0 [5,9 ; 16,1]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,8 [11,6 ; 24,0]

HOMMES : Effectif = 87

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	18,6 [10,4 ; 26,8]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,5 [0,7 ; 9,9]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	51,4 [40,0 ; 62,7]
Demande psychologique élevée	28,2 [18,7 ; 37,8]
Soutien social faible	22,6 [13,7 ; 31,6]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	13,8 [6,5 ; 21,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,0
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	1,2 [0,0 ; 6,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	8,2 [3,4 ; 16,2]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	9,3 [4,1 ; 17,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,5 [0,7 ; 9,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	14,0 [6,6 ; 21,3]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	22,1 [13,3 ; 30,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	9,3 [4,1 ; 17,5]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	24,4 [15,3 ; 33,5]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	7,0 [2,6 ; 14,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	1,2 [0,0 ; 6,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	8,2 [3,4 ; 16,2]

FEMMES : Effectif = 256

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,0 [8,8 ; 17,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	0,4 [0,0 ; 2,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	35,3 [29,0 ; 41,6]
Demande psychologique élevée	27,4 [21,9 ; 32,9]
Soutien social faible	24,8 [19,4 ; 30,2]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	19,3 [14,4 ; 24,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,2 ; 3,4]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,4 [0,9 ; 5,1]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	15,0 [10,6 ; 19,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,7 [6,9 ; 14,5]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,5 [1,6 ; 6,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	17,4 [12,7 ; 22,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	27,6 [22,1 ; 33,1]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	4,7 [2,1 ; 7,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	25,9 [20,5 ; 31,3]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	3,6 [1,6 ; 6,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	4,7 [2,1 ; 7,3]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	15,1 [10,7 ; 19,5]

ENSEMBLE : Effectif = 343

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	14,5 [10,7 ; 18,2]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	1,2 [0,3 ; 3,1]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	39,3 [33,7 ; 44,9]
Demande psychologique élevée	27,6 [22,8 ; 32,4]
Soutien social faible	24,2 [19,6 ; 28,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	17,9 [13,8 ; 22,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	0,9 [0,2 ; 2,6]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,1 [0,8 ; 4,2]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	13,3 [9,7 ; 16,9]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	10,4 [7,1 ; 13,6]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	3,5 [1,6 ; 5,5]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	16,5 [12,6 ; 20,5]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	26,2 [21,5 ; 30,8]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	5,9 [3,4 ; 8,4]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	25,5 [20,9 ; 30,2]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	4,4 [2,2 ; 6,6]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	3,8 [1,8 ; 5,9]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	13,4 [9,7 ; 17,0]

HOMMES : Effectif = 185

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	13,7 [8,7 ; 18,7]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,2 [0,6 ; 5,5]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	39,5 [32,2 ; 46,8]
Demande psychologique élevée	22,8 [16,7 ; 28,9]
Soutien social faible	25,7 [19,3 ; 32,1]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	11,4 [6,8 ; 16,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,1 [0,1 ; 3,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	4,3 [1,9 ; 8,4]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	18,9 [13,3 ; 24,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	7,6 [3,8 ; 11,4]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,5 [2,7 ; 9,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	8,7 [4,6 ; 12,8]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	22,3 [16,3 ; 28,3]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	14,1 [9,1 ; 19,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	22,4 [16,4 ; 28,4]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	14,6 [9,5 ; 19,7]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	5,4 [2,6 ; 9,8]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	17,8 [12,3 ; 23,4]

FEMMES : Effectif = 170

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	18,1 [12,2 ; 23,9]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	3,6 [1,3 ; 7,7]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	16,6 [10,7 ; 22,4]
Demande psychologique élevée	27,3 [20,5 ; 34,1]
Soutien social faible	30,8 [23,5 ; 38,0]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	34,9 [27,7 ; 42,1]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,2 [0,1 ; 4,3]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	2,4 [0,6 ; 5,9]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	45,8 [38,3 ; 53,4]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,9 [4,6 ; 13,2]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,3 [2,5 ; 9,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	4,7 [2,1 ; 9,1]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	18,1 [12,2 ; 23,9]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	1,8 [0,4 ; 5,2]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	26,2 [19,5 ; 32,8]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	3,0 [1,0 ; 6,8]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	8,3 [4,2 ; 12,5]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	42,9 [35,4 ; 50,3]

ENSEMBLE : Effectif = 355

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

Facteurs de risque généraux

Mouvements très répétitifs du membre supérieur plus de 4 heures par jour	15,8 [12,0 ; 19,6]
Pauses < 10 minutes par heure si les gestes sont très répétitifs	2,9 [1,4 ; 5,2]
Manipulation de charges de plus de 4 kg plus de 4 heures par jour	28,6 [23,7 ; 33,5]
Demande psychologique élevée	24,9 [20,4 ; 29,5]
Soutien social faible	28,1 [23,2 ; 32,9]

Postures inconfortables de la nuque

Mouvements de flexion du cou plus de 4 heures par jour	22,7 [18,3 ; 27,0]
Mouvements d'extension du cou plus de 4 heures par jour	1,1 [0,3 ; 2,9]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 4 heures par jour	3,4 [1,5 ; 5,3]
Travail sur écran plus de 4 heures par jour	31,7 [26,9 ; 36,6]

Postures inconfortables de l'épaule

Travail avec les mains au-dessus des épaules plus de 2 heures par jour	8,2 [5,4 ; 11,1]
Extension de ou des bras en arrière plus de 2 heures par jour	5,4 [3,0 ; 7,8]
Travail avec les bras éloignés du corps plus de 2 heures par jour	6,8 [4,2 ; 9,4]

Postures inconfortables du coude

Mouvements de flexion/extension du coude plus de 2 heures par jour	20,3 [16,1 ; 24,5]
Mouvement de prono-supination plus de 2 heures par jour	8,3 [5,4 ; 11,1]

Postures inconfortables du poignet et de la main

Mouvement de torsion du poignet plus de 2 heures par jour	24,2 [19,7 ; 28,7]
Utilisation d'outil vibrant plus de 2 heures par jour	9,1 [6,1 ; 12,1]
Utilisation de la pince pouce-index plus de 4 heures par jour	6,8 [4,2 ; 9,5]
Utilisation d'un clavier informatique plus de 4 heures par jour	29,7 [25,0 ; 34,5]